

## Эспол



### Код АТХ:

- [M02AB](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Капсаицин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Мазь для наружного применения</b>	<b>1 г</b>
масло эфирное кориандровое	2.5 мг
масло эфирное лавандовое	2.5 мг
экстракт перца стручкового густой	100 мг
диметилсульфоксид	30 мг
хлороформ	25 мг

*Вспомогательные вещества:* ланолин безводный, вазелин медицинский.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат с местным раздражающим и анальгезирующим действием.

Оказывает местнораздражающее, "отвлекающее", анальгезирующее и противовоспалительное действие, усиливает местное кровообращение.

При втирании мази через 10-15 мин появляется гиперемия (покраснение кожи) и ощущение тепла.

## Показания к применению:

- ушибы, растяжения и разрывы связок без нарушения целостности кожных покровов;
- последствия растяжений связок, вывихов суставов, переломов костей;
- миозит, арталгия, артрит, люмбаго, пояснично-крестцовый радикулит, деформирующий артроз.

## Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Люмбаго](#)
- [Радикулит](#)
- [Растяжение](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

## Противопоказания:

- нарушение целостности кожных покровов;
- беременность и период лактации;
- детский возраст до 2 лет;
- гиперчувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Наружно. Слегка втирают 2-3 г мази 2-3 раза/сут. Эффект усиливается при наложении сухой согревающей повязки. Длительность лечения от 1 до 10 суток.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (зуд, шелушение кожи).

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно совместное применение с другими лекарственными средствами.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не допускать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и поврежденные участки кожи.

При появлении аллергических реакций втирание мази прекращают, а остатки мази удаляют с помощью салфетки, смоченной мыльной водой.

После применения необходимо вымыть руки с мылом.

**Эспол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Влияние не способность управлять транспортным средством и работать с механизмами*

Не влияет.

**Условия хранения:**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Espol>