

[Эспумизан 40](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Симетикон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Эмульсия для приема внутрь** в виде бесцветной или почти бесцветной мутной жидкости с практически однородно распределенным суспендированным компонентом, с фруктовым запахом.

	5 мл (1 мерн. ложка)	100 мл
симетикон	40 мг	800 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.15 мг, кармеллоза натрия - 2.1 мг, полисорбат 80 - 0.1 г, натрия цикламат - 0.04 мг, кремния диоксид коллоидный - 0.024 мг, натрия сахаринат - 0.006 мг, ароматизатор банановый - 0.2 г, хлористоводородная кислота 1M0 - 0.239 г, вода очищенная - 97.361 мг.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, уменьшающий газообразование в кишечнике. Активный компонент симетикон - поверхностно-активное вещество, снижает поверхностное натяжение находящихся в желудочно-кишечном тракте газовых пузырьков, которые при этом распадаются. Прием Эспумизана 40 перед началом диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, вызываемых пузырьками газа. Способствует тщательному орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным средством. Сиетикон не абсорбируется из ЖКТ. Выводится из организма в неизменном виде.

Показания к применению:

— симптомы метеоризма: вздутие живота, чувство распирания и переполнения в подложечной области, усиленное гаообразование (в т.ч. в послеоперационном периоде, а также у новорожденных и грудных детей);

— аэрофагия;

— диспепсия;

— синдром Рэмхельда;

Эспумизан 40

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, рентгенография и др.), в т.ч. в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения методом двойного контрастирования;

— отравления тензидами (в т.ч. поверхностно-активными веществами, входящими в состав моющих средств) в качестве пеногасителя.

Относится к болезням:

- [Вздутие живота](#)
- [Диспепсия](#)
- [Метеоризм](#)

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При метеоризме:

Взрослым по 2 мерных ложки 3-5 раз/сут.

Детям в возрасте от 6 до 14 лет по 1-2 мерной ложки 3-5 раз/сут.

Детям грудного и младшего возраста назначают по 1 мерной ложке 3-5 раз/сут.

Препарат принимают внутрь во время приема пищи или после еды, при необходимости также перед сном.

Детям грудного и младшего возраста препарат дают с детским питанием из бутылочки или с жидкостью после еды.

Перед употреблением флакон с эмульсией необходимо взбалтывать.

Для подготовки к рентгенографии и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости:

Назначают по 2 мерных ложки 3 раза/сут за день до исследования и 2 мерных ложки утром в день исследования.

Для получения двойного контрастного изображения добавляют 20-40 мл эмульсии на 1 литр контрастной взвеси.

При отравлениях моющими средствами препарат назначают **взрослым** по 50-100 мл, **детям** - по 10-50 мл Эспумизана 40 в зависимости от тяжести отравления.

Побочное действие:

В отдельных случаях - индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Эспумизан 40 с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Условия хранения:

При температуре + 15 °С до +25°С . Предохранять от замораживания. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Дата окончания срока годности препарата приводится на складной картонной коробочке и на самом флаконе.

После истечения этого срока препарат использовать нельзя!

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Espumizan_40