Эспумизан Экстра



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Гранулы*** белого или почти белого цвета, неправильной формы с запахом лимона.

	1 саше
симетикон	125 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол - 647.9 мг, тальк - 20 мг, яблочная кислота - 6 мг, ароматизатор лимонный - 1 мг, ароматизатор сливочный - 0.1 мг.

800 мг - саше из фольги алюминиевой (14) - пачки картонные.
800 мг - саше из фольги алюминиевой (28) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство, уменьшающее метеоризм. Получают путем встраивания 4-7% кремния в молекулу диметикона (диметилполисилоксана) со степенью полимеризации между 20 и 400. Уменьшает поверхностное натяжение находящихся в кишечнике газовых пузырьков, вызывая их распад. Высвобождающиеся газы частично поглощаются стенками кишечника, а также выводятся из организма за счет перистальтики кишечника.

Фармакокинетика

Вследствие физиологической и химической инертности не всасывается в организме, после прохождения через ЖКТ выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

Метеоризм (в т.ч. в послеоперационном периоде), аэрофагия, гастрокардиальный синдром (в качестве симптоматической терапии); подготовка больных к эндоскопическим, радиологическим и сонографическим исследованиям желудка и/или кишечника.

Относится к болезням:

- Гастрит

Противопоказания:

Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к симетикону.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Диарея

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием абсорбции активного вещества риск для плода и проникновение симетикона в грудное молоко маловероятны.

Источник: http://drugs.thead.ru/Espumizan_Ekstra