Эспумизан L



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Симетикон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Эмульсия для приема внутрь*** молочно-белого цвета, слегка вязкая, с запахом банана.

	1 мл (25 капель)
симетикон	40 мг

Вспомогательные вещества: гипролоза (МЗ=3.0), сорбиновая кислота, натрия цикламат, натрия сахаринат, ароматизатор банановый №516060, вода очищенная.

30 мл - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей и мерным колпачком (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ветрогонное средство. Активный компонент симетикон **-** поверхностно-активное вещество, снижает поверхностное натяжение находящихся в ЖКТ газовых пузырьков, которые при этом распадаются.

Применение Эспумизана L для подготовки и проведения диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, вызываемых пузырьками газа.

Фармакокинетика

Симетикон не абсорбируется из ЖКТ. Выводится из организма в неизменном виде.

Показания к применению:

— симптомы метеоризма: вздутие живота, чувство распирания и переполнения в подложечной области, усиленное газообразование (в т.ч. в послеоперационном периоде, а также у новорожденных и грудных детей);

— кишечные колики;

— подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, рентгенография), в т.ч. в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения методом двойного контрастирования;

— отравления тензидами (в т.ч. поверхностно-активными веществами, входящими в состав моющих средств) в качестве пеногасителя.

Относится к болезням:

- Вздутие живота
- Кишечная колика
- Кишечные колики
- Метеоризм

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для дозирования капель флакон необходимо держать вертикально отверстием вниз. Перед употреблением флакон с эмульсией необходимо взбалтывать.

При *метеоризме* **взрослым и детям старше 14 лет** назначают по 2 мл (50 капель) эмульсии 3-5 раз/сут; **детям в возрасте от 6 до 14 лет** - по 1-2 мл (25-50 капель) 3-5 раз/сут; **детям в возрасте от 1 года до 6 лет** - по 1 мл (25 капель) 3 -5 раз/сут; **грудным детям** - 1 мл (25 капель) препарата добавляют в бутылочку с детским питанием или с помощью маленькой ложечки дают до или после кормления грудью.

Препарат принимают внутрь во время приема пищи или после еды, при необходимости также перед сном. Продолжительность применения зависит от выраженности симптомов. В случае необходимости Эспумизан L можно принимать в течение длительного времени.

Для *подготовки к рентгенографии и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости* назначают по 2 мл (50 капель) 3 раза/сут за день до исследования и 2 мл (50 капель) утром в день исследования.

Для *получения двойного контрастного изображения* добавляют 4-8 мл (100-200 капель) эмульсии на 1 литр контрастной взвеси.

При *отравлениях моющими средствами* препарат назначают **взрослым** по 10-20 мл (1/3-2/3 содержимого флакона), **детям** - по 2.5-10 мл (65 капель-1/3 содержимого флакона) препарата Эспумизан L в зависимости от тяжести отравления.

Побочное действие:

Побочные реакции, связанные с применением препарата, не наблюдались.

Передозировка:

Нет данных о случаях передозировки препарата Эспумизан L.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о возможности и безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Эспумизан L с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Эспумизан L можно принимать также после операций.

Эмульсия не содержит сахара и может применяться у больных сахарным диабетом.

Применение в детском возрасте

Применяется у детей по показаниям согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. После вскрытия флакона препарат использовать в течение 4 недель.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Espumizan_L