Эспумизан бэби



Код АТХ:

- A03AX13

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Симетикон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капли для приема внутрь*** молочно-белого цвета, слегка вязкая, с запахом банана.

	1 мл (25 капель)
симетикон	100 мг

Вспомогательные вещества: макрогола стеарат 40 - 6.17 мг, глицерил моностеарат 40-55 - 3.78 мг, карбомер - 5.98 мг, банановый ароматизатор - 3.98 мг, калия ацесульфам - 0.3 мг, сорбитол жидкий (некристаллизующийся) - 199.17 мг, натрия хлорид - 0.67 мг, натрия цитрат - 4.19 мг, натрия гидроксид - 0.67 мг, сорбиновая кислота - 1.06 мг, вода очищенная - 732.25 мг.

30 мл - флаконы темного стекла с капельницей-дозатором (1) в комплекте с мерным колпачком - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика
Средство, уменьшающее метеоризм. Получают путем встраивания 4-7% кремния в молекулу диметикона (диметилполисилоксана) со степенью полимеризации между 20 и 400. Уменьшает поверхностное натяжение находящихся в кишечнике газовых пузырьков, вызывая их распад. Высвобождающиеся газы частично поглощаются стенками кишечника, а также выводятся из организма за счет перистальтики кишечника.

Фармакокинетика

Вследствие физиологической и химической инертности не всасывается в организме, после прохождения через ЖКТ выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

Метеоризм (в т.ч. в послеоперационном периоде), аэрофагия, гастрокардиальный синдром (в качестве симптоматической терапии); подготовка больных к эндоскопическим, радиологическим и сонографическим исследованиям желудка и/или кишечника.

Относится к болезням:

- Гастрит

Противопоказания:

Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к симетикону.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Диарея

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием абсорбции активного вещества риск для плода и проникновение симетикона в грудное молоко маловероятны.

Источник: http://drugs.thead.ru/Espumizan_bebi