

Эссливер форте



Код АТХ:

- [A05C](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Фосфолипиды](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, с красным корпусом и коричневой крышечкой; содержимое капсул - порошок от розовато-желтого до оранжевого цвета, допускается наличие частиц в виде уплотненной порошкообразной массы от желтовато-белого до коричневого цвета.

	1 капс.
"эссенциальные" фосфолипиды (содержащие в т.ч. фосфатидилхолин 29%, фосфатидилэтаноламин)	300 мг
тиамина мононитрат	6 мг
рибофлавин	6 мг
пиридоксина гидрохлорид	6 мг
цианокобаламин	6 мкг
никотинамид	30 мг
α-токоферола ацетат	6 мг

Вспомогательные вещества: натрия метилгидроксibenзоат, натрия пропилгидроксibenзоат, динатрия эдетат, бутилгидрокситолуол, тальк очищенный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Состав оболочки капсулы: брнопол, повидон, натрия лаурилсульфат (натрия додецилсульфат), глицерол, титана диоксид, кармазин, краситель "Солнечный закат" желтый, бриллиантовый голубой, вода очищенная, желатин.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор. Действие обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав препарата.

"Эссенциальные" фосфолипиды - сложные вещества, представляющие собой диглицеридные эфиры фосфатидных и ненасыщенных жирных кислот (в основном олеиновой и линолевой). Являются важным структурным элементом клеточных мембран и мембран органелл гепатоцитов. Фосфолипиды регулируют проницаемость мембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая нормальные процессы окислительного фосфорилирования.

Препарат нормализует биосинтез фосфолипидов и общий липидный обмен при повреждениях гепатоцитов различной этиологии.

Восстанавливает мембраны гепатоцитов путем структурной регенерации и за счет конкурентного ингибирования окислительных процессов: встраиваясь в биомембраны, ненасыщенные жирные кислоты способны принимать на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов.

Способствует регенерации клеток печени, стабилизирует физико-химические свойства желчи.

Тиамин (витамин В₁) в качестве кофермента участвует в углеводном обмене.

Рибофлавин (витамин В₂) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.

Пиридоксин (витамин В₆) в качестве кофермента принимает участие в метаболизме аминокислот и белков.

Цианокобаламин (витамин В₁₂) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.

Никотинамид (витамин РР) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от перекисного окисления липидов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Эссливер Форте не предоставлены.

Показания к применению:

- нарушения липидного обмена различного генеза;
- жировая дистрофия печени различной этиологии;
- цирроз печени;
- алкогольные и наркотические поражения печени;
- лекарственные поражения печени;
- радиационное поражение печени;
- псориаз (в составе комбинированной терапии).

Относится к болезням:

- [Лекарственное поражение печени](#)
- [Псориаз](#)
- [Цирроз печени](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 2 капс. 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения составляет не менее 3 месяцев. При необходимости возможно более длительное применение препарата или проведение повторных курсов лечения после консультации врача.

При *псориазе* препарат применяют в качестве средства вспомогательной терапии по 2 капс. 3 раза/сут в течение 2 недель.

Препарат следует принимать во время еды; капсулы следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - чувство дискомфорта в эпигастральной области.

Прочие: аллергические реакции.

Обычно препарат хорошо переносится.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Эссливер Форте не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью возможно применение препарата Эссливер Форте при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Эссливер Форте не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Использование в педиатрии

С осторожностью возможно применение препарата у **детей в возрасте до 12 лет**.

При нарушениях функции печени

Возможно применение по показаниям.

Применение в детском возрасте

С осторожностью возможно применение препарата у **детей в возрасте до 12 лет**.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

Эсливер форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Essliver_forte