

Этадекс-Мэз



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Этаден-8-(2-гидроксиэтил)-аминоаденина гидробромида моногидрат.

Производное пурина, стимулятор репаративной регенерации клеток. Механизм действия связан с активизацией синтеза нуклеиновых кислот. Ускоряет репаративные процессы, в первую очередь в быстрообновляющихся тканях (эпителиальная и кроветворная).

Уменьшает отек, боль, повышает остроту зрения. Способствует регенерации дефектов роговицы, формированию рубца и восстановлению гладкой сферической поверхности роговицы.

Показания к применению:

Стимуляция регенерации эпителия роговицы при различных поражениях глаз, сопровождающихся нарушением целостности ее эпителия:

- эпителиопатия после инфекционно-воспалительных заболеваний;
- синдром "сухих глаз" (в комбинации с препаратами искусственной слезы);
- буллезная кератопатия;
- начальная эпителиально-эндотелиальная дистрофия;
- эпителиальные дефекты после офтальмологических операций (удаление катаракты, хирургическое лечение глаукомы);
- послеоперационные десцеметиты;
- рецидивирующие эрозии;
- язвы бактериальной, грибковой и герпетической этиологии (в составе комбинированной терапии);
- ожоги;
- кератиты с изъязвлением и поражением поверхностных слоев роговицы.

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Глаукома](#)
- [Инфекции](#)
- [Катаракта](#)
- [Кератит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно, в виде инстилляций в конъюнктивальный мешок - по 2-3 капли 3 раза/сут. В зависимости от этиологии процесса и тяжести поражения органа параллельно возможно местное назначение других специфических и симптоматических лекарственных средств. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней. Отсутствие лечебного эффекта при применении препарата в течение 10 дней указывает на необходимость использования других методов лечения.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Замораживание раствора не допускается.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Etadeks-Mez>