Этадекс-Мэз



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Этаден-8-(2-гидрооксиэтил)-аминоаденина гидробромида моногидрат.

Производное пурина, стимулятор репаративной регенерации клеток. Механизм действия связан с активизацией синтеза нуклеиновых кислот. Ускоряет репаративные процессы, в первую очередь в быстрообновляющихся тканях (эпителиальная и кроветворная).

Уменьшает отек, боль, повышает остроту зрения. Способствует регенерации дефектов роговицы, формированию рубца и восстановлению гладкой сферической поверхности роговицы.

Показания к применению:

Стимуляция регенерации эпителия роговицы при различных поражениях глаз, сопровождающихся нарушением целостности ее эпителия:

— эпителиопатия после инфекционно-воспалительных заболеваний;

— синдром "сухих глаз" (в комбинации с препаратами искусственной слезы);

— буллезная кератопатия;

— начальная эпителиально-эндотелиальная дистрофия;

— эпителиальные дефекты после офтальмологических операций (удаление катаракты, хирургичекое лечение глаукомы);

— послеоперационные десцеметиты;

— рецидивирующие эрозии;

— язвы бактериальной, грибковой и герпетической этиологии (в составе комбинированной терапии);

— ожоги;

— кератиты с изъязвлением и поражением поверхностных слоев роговицы.

Относится к болезням:

- Герпес
- Глаукома
- Инфекции
- Катаракта
- Кератит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно, в виде инстилляций в конъюнктивальный мешок - по 2-3 капли 3 раза/сут. В зависимости от этиологии процесса и тяжести поражения органа параллельно возможно местное назначение других специфических и симптоматических лекарственных средств. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней. Отсутствие лечебного эффекта при применении препарата в течение 10 дней указывает на необходимость использования других методов лечения.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Замораживание раствора не допускается.

Источник: http://drugs.thead.ru/Etadeks-Mez