

[Этимизола раствор 1,5% в ампулах](#)



Код АТХ:

- [R07AB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Метиламид этилимидазолдикарбонат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для инъекций, в ампулах по 3 мл, в картонной коробке 10 ампул.

Состав:

1 мл раствора для инъекций содержит

Активное вещество: этимизола 15 мг, в ампулах по 3 мл; в картонной коробке 10 шт.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие — аналептическое, противовоспалительное, противоаллергическое.

Возбуждает дыхательный центр, стимулирует выработку глюкокортикоидов, повышает синтез сурфактанта.

Показания к применению:

Угнетение дыхания, гиповентиляция легких, астенодепрессивные состояния, полиартрит, бронхиальная астма, бронхоспазм, асфиксия новорожденных.

Относится к болезням:

- [Астенодепрессивные состояния](#)
- [Асфиксия новорожденных](#)
- [Бронхиальная астма](#)
- [Бронхоспазм](#)
- [Гиповентиляция легких](#)
- [Полиартрит](#)
- [Угнетение дыхания](#)

Противопоказания:

Возбуждение ЦНС.

Способ применения и дозы:

В/в (медленно), в/м, п/к, для стимуляции дыхания — 0,6–1 мг/кг массы больного 1–2 раза в день; при асфиксии новорожденных — 0,5 мл 0,6% раствора, при бронхоспазме — 2 мл 1,5% раствора 2 раза в день.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, головокружение, нарушение сна, двигательное возбуждение.

Условия хранения:

В защищенном от света месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Etimizola_rastvor_15_v_ampulah