

## [Этимизола раствор 1,5% в ампулах](#)



### **Код АТХ:**

- [R07AB](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Метиламид этилимидазолдикарбонат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Раствор для инъекций, в ампулах по 3 мл, в картонной коробке 10 ампул.

### **Состав:**

**1 мл раствора для инъекций содержит**

*Активное вещество:* этимизола 15 мг, в ампулах по 3 мл; в картонной коробке 10 шт.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Фармакологическое действие — аналептическое, противовоспалительное, противоаллергическое.

Возбуждает дыхательный центр, стимулирует выработку глюкокортикоидов, повышает синтез сурфактанта.

## Показания к применению:

Угнетение дыхания, гиповентиляция легких, астенодепрессивные состояния, полиартрит, бронхиальная астма, бронхоспазм, асфиксия новорожденных.

## Относится к болезням:

- [Астенодепрессивные состояния](#)
- [Асфиксия новорожденных](#)
- [Бронхиальная астма](#)
- [Бронхоспазм](#)
- [Гиповентиляция легких](#)
- [Полиартрит](#)
- [Угнетение дыхания](#)

## Противопоказания:

Возбуждение ЦНС.

## Способ применения и дозы:

В/в (медленно), в/м, п/к, для стимуляции дыхания — 0,6–1 мг/кг массы больного 1–2 раза в день; при асфиксии новорожденных — 0,5 мл 0,6% раствора, при бронхоспазме — 2 мл 1,5% раствора 2 раза в день.

## Побочное действие:

Тошнота, рвота, головокружение, нарушение сна, двигательное возбуждение.

## Условия хранения:

В защищенном от света месте.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Etimizola\\_rastvor\\_15\\_v\\_ampulah](http://drugs.thead.ru/Etimizola_rastvor_15_v_ampulah)