

## [Эуфорбиум Композитум Назентропфен С](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный гомеопатический** в виде прозрачной или слабоопалесцирующей, бесцветной или светло-желтой жидкости без запаха.

	<b>100 г</b>
Euphorbium (эуфорбиум) D4	1 г
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратензис (пульсатилла)) D2	1 г
Luffa operculata (люффа оперкулята) D2	1 г
Hydrargyrum biiodatum (Mercurius biiodatus) (гидраргирум бийодатум (меркуриус бийодатус)) D8	1 г
Mucosa nasalis suis (мукоза назалис суис) D8	1 г
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcaеum) (гепар сульфурис калькареум) D10	1 г
Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D10	1 г
Sinusitis-Nosode (синуситис-Нозоде) D13	1 г

*Вспомогательные вещества:* раствор бензалкония хлорида - 0.02 г, натрия хлорид 0.8292 г, натрия дигидрофосфата дигидрат - 0.0628 г, натрия гидрофосфата дигидрат - 0.02 г, вода очищенная - 91.068 г.

20 мл - флаконы темного стекла с дозатором-распылителем (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

### Показания к применению:

- риниты различной этиологии;
- хронические синуситы.

### Относится к болезням:

- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## **Противопоказания:**

- детский возраст до 4-х лет в связи с недостаточностью клинических данных;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях щитовидной железы (в связи с наличием активного компонента, содержащего йод).

## **Способ применения и дозы:**

**Детям с 6 до 12 лет, а также детям старше 12 лет и взрослым** впрыскивают по 1-2 дозы в каждый носовой ход 3-5 раз/сут; **детям от 4 до 6 лет** осторожно впрыскивают по 1 дозе 3-4 раза/сут.

## **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции.

В *редких случаях* возможно повышенное слюноотделение после применения препарата.

В *очень редких случаях* возможно возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью к астме. При их развитии необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации врача.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и другие).

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 4-х лет в связи с недостаточностью клинических данных.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Euforbium\\_Kompozitum\\_Nazentropfen\\_S](http://drugs.thead.ru/Euforbium_Kompozitum_Nazentropfen_S)