Эуфорбиум Композитум Назентропфен С



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный гомеопатический*** в виде прозрачной или слабоопалесцирующей, бесцветной или светло-желтой жидкости без запаха.

	100 г
Euphorbium (эуфорбиум) D4	1 г
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратензис (пульсатилла)) D2	1 г
Luffa operculata (люффа оперкулята) D2	1 г
Hydrargyrum biiodatum (Mercurius bijodatus) (гидраргирум бийодатум (меркуриус бийодатус)) D8	1 г
Mucosa nasalis suis (мукоза назалис суис) D8	1 г
Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис калькареум) D10	1 г
Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D10	1 г
Sinusitis-Nosode (синуситис-Нозоде) D13	1 г

Вспомогательные вещества: раствор бензалкония хлорида - 0.02 г, натрия хлорид 0.8292 г, натрия дигидрофосфата дигидрат - 0.0628 г, натрия гидрофосфата дигидрат - 0.02 г, вода очищенная - 91.068 г.

20 мл - флаконы темного стекла с дозатором-распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— риниты различной этиологии;

— хронические синуситы.

Относится к болезням:

- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— детский возраст до 4-х лет в связи с недостаточностью клинических данных;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях щитовидной железы (в связи с наличием активного компонента, содержащего йод).

Способ применения и дозы:

Детям с 6 до 12 лет, а также детям старше 12 лет и взрослым впрыскивают по 1-2 дозы в каждый носовой ход 3-5 раз/сут; **детям от 4 до 6 лет** осторожно впрыскивают по 1 дозе 3-4 раза/сут.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

В *редких случаях* возможно повышенное слюноотделение после применения препарата.

В *очень редких случаях* возможно возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью к астме. При их развитии необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации врача.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера и оператора и другие).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 4-х лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Euforbium_Kompozitum_Nazentropfen_S