

[Эвалар](#)



Код АТХ:

- [A13A](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Эликсир (водно-спиртовое извлечение из смеси 15 видов растительного лекарственного сырья) в бутылках по 100 и 250 мл.

Состав:

Эликсир содержит

Активные вещества: корневища и корни элеутерококка, корневища с корнями рапунтикума сафлоровидного, корни солодки голой, трава зверобой продырявленный, слоевища ламинарии, цветки бессмертника песчаного, плоды боярышника, цветки ромашки, листья подорожника большого, трава тысячелистник, листья мяты перечной, корневища и корни родиолы розовой, плоды рябины, плоды шиповника, плоды кориандра посевного, орех кедровый (семяна сосны кедровой сибирской), семяна (плоды) каштана конского обыкновенного, плоды клюквы свежей

Вспомогательные вещества: этиловый спирт (30–35%), пантокрин, мед натуральный, колер, сахар.

Описание:

Экстракт для приема внутрь (жидкий) в виде жидкости темно-коричневого цвета с зеленоватым или красноватым оттенком, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие; повышает физическую и умственную работоспособность.

Показания к применению:

Данный препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- астения;
- реконвалесценция (после соматических и инфекционных заболеваний);
- период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- работа, сопряженная с большими нервно-психическими и физическими нагрузками.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

Эвалар не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже. Если какие-либо из этих состояний развиваются впервые на фоне приема, препарат должен быть немедленно отменен:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации;
- острая сердечно-сосудистая недостаточность;
- острая почечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, взрослым, за 10–15 мин до еды, по 2–3 ч.ложки (10–15 мл), разведенных в 100 мл воды, 2 раза в сутки в течение 2–3 нед. Повторный курс после консультации с врачом — 1–2 нед.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия Югланэкса с другими лекарственными препаратами не установлено

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата следует учитывать, что в его составе содержится 30-35% этилового спирта. Препарат влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, в плотно закрытой упаковке, при температуре не выше 30 °С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Evalar>