Эвкабал



Код АТХ:

- R05CA10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Подорожника экстракт жидкий
- Тимьяна экстракт жидкий

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** темно-коричневого цвета, прозрачный, со сладким вкусом и ароматным запахом.

	100 г
жидкий экстракт подорожника	3 г
жидкий экстракт тимьяна	15 г

Вспомогательные вещества: метил-4-гидроксибензоат, пропил-4-гидроксибензоат, инвертного сахара раствор (декстроза, фруктоза, сахароза), вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) - коробки картонные.
250 мл - флаконы темного стекла (1) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, а также спастическим кашлем:

— трахеит;

— бронхит;

— трахеобронхит.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* (из-за наличия этанола) назначают препарат при заболеваниях печени, хроническом алкоголизме, эпилепсии, черепно-мозговой травме, а также детям.

С *осторожностью* применяют препарат у больных сахарным диабетом и у лиц, находящихся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Способ применения и дозы:

Сироп следует принимать в неразбавленном виде после еды.

Рекомендуемые дозы представлены в таблице.

Возраст	Рекомендуемые дозы
Дети в возрасте от 6 мес до 1 года	1 чайная ложка 1 раз/сут
Дети младшего возраста	1 чайная ложка 2 раза/сут
Дети школьного возраста	1 столовая ложка 2 раза/сут
Взрослые	1-2 столовые ложки 3-5 раз/сут

Длительность приема препарата определяется индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания, и при легких формах составляет 2 недели. Рекомендуется принимать препарат еще в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания.

Пациента необходимо предупредить о необходимости обратиться к врачу, если через 2-3 недели улучшение состояния не наблюдается.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции (в т.ч. из-за содержания в препарате алкил-4-гидроксибензоатов).

Пациента необходимо предупредить о необходимости обратиться к врачу при появлении побочных эффектов.

Передозировка:

Данных по передозировке препарата не предоставлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью (из-за наличия этанола) назначают препарат при беременности, в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Вследствие содержания этанола препарат способствует усилению действия седативных, снотворных и других средств, угнетающих ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата следует учитывать, что сироп содержит 6.5 об.% этанола.

Общее содержание сахара (в пересчете на сахарозу) составляет 0.6 г/мл. В 1 чайной ложке (5 мл) содержится 0.25 ХЕ или 3.0 г сахарозы, в 1 столовой ложке (10 мл) - 0.5 ХЕ или 6.0 г сахарозы.

Не рекомендуется одновременное применение противокашлевых лекарственных средств.

При помутнении сиропа или выпадении осадка препарат применять не следует.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* (из-за наличия этанола) назначают препарат при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

С осторожностью применяют препарат у детей.

Возраст	Рекомендуемые дозы
Дети в возрасте от 6 мес до 1 года	1 чайная ложка 1 раз/сут
Дети младшего возраста	1 чайная ложка 2 раза/сут
Дети школьного возраста	1 столовая ложка 2 раза/сут

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Evkabal