

Эвкабал С



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Эмульсия для ингаляций и наружного применения** светло-голубого цвета, с запахом эвкалипта.

	100 г
масло эвкалиптовое	10 г
масло хвои сосны	3 г

Вспомогательные вещества: цетилстеариловый спирт, глицерола моностеарат, макрогола стеарат, натрия цетилстеарилсульфат, трометамол, лимонной кислоты моногидрат, гвайазулен, вода очищенная.

40 мл - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

100 мл - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отхаркивающий препарат растительного происхождения для ингаляций, ванн и наружного применения. Оказывает также противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Эвкабал С не предоставлены.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии заболеваний верхних отделов дыхательных путей (в т.ч. риниты, фарингиты, бронхиты).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Ринит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- бронхиальная астма;
- коклюш;
- детский возраст до 2 мес (для применения в виде ванн и растираний);
- детский возраст до 5 лет (для применения в виде ингаляций);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не следует применять препарат в виде растираний при нарушении целостности кожных покровов, наличии кожных заболеваний на участках предполагаемого применения.

Не следует использовать препарат в виде растираний в области лица (особенно носа) у грудных детей и детей младшего возраста.

Применение препарата в виде **ванн** имеет следующие противопоказания:

- заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, аритмия, стенокардия) в стадии декомпенсации;
- повышение температуры тела (более 38°C) при инфекционных заболеваниях.

Способ применения и дозы:

При применении препарата в виде *растираний* рекомендуется 2-3 раза/сут нанести полоску эмульсии длиной 3-5 см на кожу груди и межлопаточную область и хорошо растереть.

При применении препарата в виде *паровых ингаляций* рекомендуется полоску эмульсии длиной 3-5 см добавить в 1-2 л горячей воды, перемешать и дышать паром под полотенцем.

При применении препарата в виде *ванн* (в основном у грудных детей в возрасте старше 2 месяцев и детей младшего возраста) полоску эмульсии длиной 8-10 см добавляют к 20 л воды температуры 36-37°C (для **грудных детей**) или 2 полоски длиной 10 см на 40 л (для **детей младшего возраста**), продолжительность купания - 10 мин. Ванны повторяют до полного исчезновения симптомов заболевания, 3-4 раза в неделю. Дополнительно, при необходимости, эмульсию втирают в кожу груди и межлопаточную область. Детям рекомендуется соблюдать постельный режим.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, усиление бронхоспазма.

Передозировка:

До настоящего времени передозировка препарата не описана.

При случайном приеме внутрь возможно развитие тошноты, рвоты, диареи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о возможности применения препарата при беременности и в период лактации решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До настоящего времени лекарственное взаимодействие препарата Эвкабал С не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для ингаляций и наружного применения.

После принятия ванны не следует принимать душ и растираться полотенцем.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Применение в детском возрасте

Противопоказания:

- детский возраст до 2 мес (для применения в виде ванн и растираний);
- детский возраст до 5 лет (для применения в виде ингаляций).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Evkabal_S