ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нитрофурал

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения*** от светло-желтого до желтого цвета с вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской на обеих сторонах; допускается шероховатость поверхности.

	1 таб.
нитрофурал (фурацилин)	20 мг

Вспомогательные вещества: винная кислота - 375 мг, натрия гидрокарбонат - 299 мг, натрия карбонат - 325 мг, натрия хлорид - 100 мг, макрогол 20000 - 65 мг, повидон среднемолекулярный - 16 мг.

2 шт. - упаковки безъячейковые контурные (5) (стрипы) - пачки картонные.
10 шт. - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
15 шт. - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
20 шт. - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
25 шт. - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
30 шт. - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
10 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
15 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
25 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus anthracis; грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp. (в т.ч. Salmonella paratyphi).

Показания к применению:

Гнойные раны, пролежни, язвы, ожоги II и III степени, остеомиелит, эмпиема плевры, анаэробная инфекция раневой поверхности, фурункул наружного слухового прохода, эмпиема придаточных пазух носа.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Ожоги
- Остеомиелит
- Плеврит
- Пролежни
- Раны
- Фурункул
- Эмпиема
- Эмпиема плевры

Противопоказания:

Аллергические дерматозы, повышенная чувствительность к нитрофуралу и другим производным нитрофурана.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Ангина
- Боли в горле
- Заболевания уха
- Ларингит

Побочное действие:

Возможно: местные аллергические реакции, дерматиты.

Особые указания и меры предосторожности:

Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Готовый раствор можно хранить в течение длительного времени.

Источник: http://drugs.thead.ru/FURACILIN_AVEKSIMA