Фалиминт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ацетиламинонитропропоксибензол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Драже*** почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью, однородные по окраске.

	1 драже
ацетиламинонитропропоксибензол	25 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, желатин, жир твердый, тальк, коповидон, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Состав оболочки: сахароза, тальк, глюкозный сироп, симетикона эмульсия 30%, парафин жидкий, парафин твердый.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Противокашлевое средство, оказывает анальгетическое, антисептическое и слабовыраженное местноанестезирующее действие. Устраняет непродуктивный раздражающий кашель, при рассасывании создает чувство прохлады в полости рта и глотке. Не оказывает высушивающего действия на слизистые оболочки, не вызывает чувство онемения во рту.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит);

— воспалительные заболевания полости рта (гингивит, стоматит);

— рефлекторный кашель (непродуктивный, раздражающий);

— подготовка к инструментальным исследованиям полости рта и зева, снятию слепков и примерке зубных протезов.

Относится к болезням:

- Гингивит
- Кашель
- Ларингит
- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 25-50 мг 3-5 раз/сут (не более 10), не разжевывая, держат во рту до рассасывания.

Побочное действие:

Возможна индивидуальная непереносимость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием достаточного опыта применения данного препарата при беременности и в период кормления грудью применять Фалиминт в это время не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До сих пор не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

Не использовать для длительного применения. Сразу после применения следует воздержаться от приема пищи и жидкости.

Больным сахарным диабетом следует учитывать содержание сахара (1 драже соответствует 0.03 хлебной единицы).

Условия хранения:

Список Б.

При температуре не выше 25°С, в защищенном от света месте.

Дата окончания срока годности препарата указана на складной картонной коробочке и на первичной упаковке.

После истечения этого срока препарат использовать нельзя.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Falimint