

## Фалиминт



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Ацетиламинонитропропоксибензол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Драже** почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью, однородные по окраске.

	<b>1 драже</b>
ацетиламинонитропропоксибензол	25 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза, желатин, жир твердый, тальк, коповидон, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

*Состав оболочки:* сахароза, тальк, глюкозный сироп, симетикона эмульсия 30%, парафин жидкий, парафин твердый.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Противокашлевое средство, оказывает анальгетическое, антисептическое и слабовыраженное местноанестезирующее действие. Устраняет непродуктивный раздражающий кашель, при рассасывании создает чувство прохлады в полости рта и глотке. Не оказывает высушивающего действия на слизистые оболочки, не вызывает чувство онемения во рту.

### **Показания к применению:**

- воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит);
- воспалительные заболевания полости рта (гингивит, стоматит);
- рефлекторный кашель (непродуктивный, раздражающий);
- подготовка к инструментальным исследованиям полости рта и зева, снятию слепков и примерке зубных протезов.

## Относится к болезням:

- [Гингивит](#)
- [Кашель](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- период лактации.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, по 25-50 мг 3-5 раз/сут (не более 10), не разжевывая, держат во рту до рассасывания.

## Побочное действие:

*Возможна индивидуальная непереносимость.*

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием достаточного опыта применения данного препарата при беременности и в период кормления грудью применять Фалиминт в это время не рекомендуется.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До сих пор не известно.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не использовать для длительного применения. Сразу после применения следует воздержаться от приема пищи и жидкости.

Больным сахарным диабетом следует учитывать содержание сахара (1 драже соответствует 0.03 хлебной единицы).

## Условия хранения:

Список Б.

При температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

Дата окончания срока годности препарата указана на складной картонной коробочке и на первичной упаковке.

После истечения этого срока препарат использовать нельзя.

## Срок годности:

5 лет.

**Фалиминт**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Falimint>