<u>Фамулан</u>



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь в виде прозрачной, бесцветной жидкости с легким специфическим запахом.

	100 мл
лук репчатый (Allium cepa) D1	3 мл
очанка лекарственная (Euphrasia) D6	10 мл
сабадилла (Sabadilla) D6	10 мл
калия йодид (Kalium iodatum) D12	10 мл
мышьяка (III) оксид (Arsenicum album) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

50 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат с противоаллергическим действием.

Показания к применению:

- аллергический ринит (сенная лихорадка);
- аллергический конъюнктивит, сопровождающихся слезотечением;
- вазомоторная ринопатия.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Конъюнктивит
- Лихорадка
- <u>Ринит</u>

Противопоказания:

- заболевания щитовидной железы (гипертиреоз);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для обеспечения наибольшей эффективности Φ амулан следует принимать за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи.

	Дозировка	Кратность приема	Способ применения
Взрослые и подростки	10 капель	3 раза/сут. Курс лечения 2-6	Внутрь, 10 капель развести в
		недель, при необходимости	столовой ложке воды за 30
		курс можно повторить	мин до или через 1 ч после
			еды, подержав некоторое
			время во рту перед
			проглатыванием

В случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием каждые 0.5-1 ч по 8-10 капель до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза/сут.

Побочное действие:

Повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации препарат применяется по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Условия хранения:

Препарат хранят при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей.

Поскольку Фамулан содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Не применять по истечении срока, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Famulan