Фансидар



Код АТХ:

• P01BD51

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пириметамин
- Сульфадоксин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ MHH PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahrn}}$

Фармакотерапевтическая группа:

• Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомалярийный препарат, нарушает обмен фолиевой кислоты плазмодия. Не обладает гипогликемическим действием. Эффективен в отношении токсоплазм.

Показания к применению:

Профилактика и лечение:

- малярия;
- токсоплазмоз;
- пневмоцистная инфекция (профилактика).

Относится к болезням:

- Инфекции
- Малярия
- Токсоплазмоз

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность (І триместр);
- возможность зачатия в период лечения;
- период лактации;
- ранний грудной возраст (до 2 мес);
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- угнетение костномозгового кроветворения.

Способ применения и дозы:

Для *лечения малярии* назначают однократные дозы: **взрослым** - 7.5 мл раствора в ампулах или 3 таб., **детям 10-14 лет** - 5 мл или 2 таб., **детям 7-9 лет** - 3.5 мл или 1.5 таб., **детям 4-6 лет** - 2.5 мл или 1 таб., **детям до 4 лет** - 1-1.5 мл или 1/2 таб.

Раствор в ампулах вводят в/м, глубоко. Для достижения быстрого терапевтического эффекта и предотвращения рецидивов рекомендуется дополнительно назначать хинин в течение 3-7 дней.

Для профилактики малярии пациентам, имеющим частичный иммунитет, назначают однократно 2-3 таб. 1 раз в 4 нед.; пациентам, у которых отсутствует иммунитет, - 1 таб. 1 раз в неделю. Детям в зависимости от возраста назначают 1/2-2 таб. 1 раз в 4 нед. (с частичным иммунитетом) или 1/2-1.5 таб. 1 раз в 2 нед. (без иммунитета).

Первую дозу препарата принимают за 1 неделю до отъезда в эндемичный район, прием продолжают в течение всего периода пребывания в этом районе, а также еще 6 недель после возвращения.

При токсоплазмозе взрослым - по 2 таб. 1 раз в неделю, в течение 6-8 нед.

Для *профилактики пневмоний* **грудным** и **детям младшего возраста** назначают 40 мг/кг (рассчитывают по содержанию сульфадоксина) 1 раз в 2 нед.; **взрослым** - 1-2 таб. в неделю.

Побочное действие:

Чувство переполнения желудка, тошнота, рвота, стоматит, гепатит, гематологические изменения (лейкопения, тромбоцитопения, мегалобластная B_{12} -дефицитная анемия, агранулоцитоз, пурпура), вялость, головная боль, лихорадка, полиневрит, легочные инфильтраты, кашель, одышка, кожные реакции (сыпь, зуд, выпадение волос, мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность (І триместр); возможность зачатия в период лечения; период лактации;

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с триметопримом или комбинациями триметоприма и сульфаниламидов (возможно усиление дефицита фолатов с соответствующими гематологическими изменениями).

При комбинированном применении с хлорохином побочные явления могут наблюдаться чаще и в более тяжелой форме.

Особые указания и меры предосторожности:

Терапия препаратом более 3 мес проводится под регулярным контролем картины крови. При длительном применении рекомендуется одновременный прием фолиевой кислоты.

Фансидар

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

При появлении на фоне лечения кашля или одышки препарат необходимо отменить.

При нарушениях функции почек

Противопоказание — почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

Противопоказание - ранний грудной возраст (до 2 мес).

При необходимости назначения препарата детям в возрасте старше 2 мес. следует внимательно изучить инструкцию по применению препарата (см. раздел "Режим дозирования" и предосторожности).

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fansidar