

## Фарингосепт



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Амбазон](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антисептическое средство для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении *Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans* и *Pneumococcus*.

### **Показания к применению:**

Профилактика и лечение острых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и гортани (тонзиллиты, стоматиты, гингивиты). Профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний после удаления зубов.

### **Относится к болезням:**

- [Гингивит](#)
- [Инфекции](#)
- [Тонзиллит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к амбазону.

### **Способ применения и дозы:**

Взрослым - 30-50 мг/сут, в течение 3-4 дней. Детям от 3 до 7 лет - 30 мг/сут.

### **Побочное действие:**

*Возможны аллергические реакции.*

### **Особые указания и меры предосторожности:**

После приема амбазона рекомендуется воздержаться от приема пищи и питья в течение 3 ч.

#### ***Применение в детском возрасте***

Назначают детям старше 3 лет

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Faringosept>