Фарматон Витал



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие желатиновые, продолговатые, гладкие, блестящие, с продольным швом, темно-коричневого цвета, опалесцирующие, с едва заметным характерным запахом; содержимое капсул - маслянистая паста желтого цвета.

	1 капс.
экстракт женьшеня G115 стандартизированный	40 мг
деанола гидротартрат	26 мг
ретинола пальмитат (вит. А)	4000 МЕ
эргокальциферол (вит. D_2)	400 МЕ
D,L-α-токоферола ацетат (вит. Е)	10 мг
тиамина мононитрат (вит. B_1)	2 мг
рибофлавин (вит. B_2)	2 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	1 мг
цианокобаламин (вит. B_{12})	1 мг
кальция пантотенат	10 мг
никотинамид (вит. РР)	15 мг
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
рутозид	20 мг
фтор (в форме кальция фторида)	0.2 мг
калий (в форме сульфата)	8 мг
медь (в форме сульфата)	1 мг
марганец (в форме марганца (II) сульфата моногидрата)	1 мг
магний (в форме сульфата)	10 мг
железо (в форме сульфата)	10 мг
цинк (в форме оксида)	1 мг
кальций (в форме гидрофосфата)	90.3 мг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	70 мг
лецитин	50 мг
лецитин соевый	16 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, воск, масло рапсовое, этилванилин, масло арахисовое, желатин.

Состав оболочки капсул: желатин, глицерол 85%, этилванилин, натрия пропилгидроксибензоат, натрия этилгидроксибензоат, железа оксид черный (Е172), железа оксид красный (Е172).

30 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

ФАРМАТОН ВИТАЛ содержит витамины, минеральные вещества в количествах, соответствующих суточной потребности, а также стандартизированный экстракт женьшеня G115.

Стандартизированный экстракт женьшеня G115 повышает общий уровень метаболизма, что сопровождается увеличением физического и умственного потенциала. После применения экстракта женьшеня наблюдается уменьшение концентрации молочной кислоты в мышечной ткани в период физической нагрузки.

Витамины, минералы и микроэлементы предупреждают и устраняют нарушения клеточного метаболизма в период повышенных нагрузок. Недостаток поступления витаминов, минералов и микроэлементов может привести к различным нарушениям самочувствия, сопровождающимся ощущением слабости, усталости, сопротивляемости организма, а также замедлением периода выздоровления. Комплекс витаминов группы В необходим для нормального метаболизма. Состав препарата и дозы компонентов соответствуют суточным дозам, рекомендуемым в странах Европейского сообщества.

Показания к применению:

— повышение работоспособности при повышенных физических и умственных нагрузках;

— астенические состояния различной этиологии, в том числе период восстановления после перенесенных заболеваний.

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— нарушения обмена кальция (симптомы нарушения - гиперкальциемия и гиперкальциурия);

— гипервитаминоз А или Dи одновременный прием препаратов, содержащих витамины А и D;

— аллергия на сою и арахис в анамнезе,

— почечная недостаточность;

— артериальная гипертензия;

— повышенная нервная возбудимость;

— острый период инфекционных заболеваний;

— эпилепсия;

— в случаях редкой наследственной непереносимости к галактозе;

— беременность и период грудного вскармливания;

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 12 лет: По 1 капсуле в день, во время еды, предпочтительно утром. Капсулы следует проглатывать целиком и запивать водой.

Лица пожилого возраста: Особых рекомендаций по дозированию не требуется.

Побочное действие:

Аллергические реакции, тошнота, боль в желудке, рвота, диарея, тахикардия, головная боль, бессонница, повышение артериального давления, повышенная нервная возбудимость.

Передозировка:

Симптомы: повышение артериального давления, бессонница, рвота, головная боль, сонливость и диарея.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: беременность и период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Женьшень усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин и др.), является антагонистом средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе, барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств). Следует избегать одновременного применения с другими витаминными препаратами, содержащими витамины A и D во избежание риска передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Во избежание нарушений сна, препарат не следует принимать во второй половине дня.

Так как препарат содержит 26 мг лактозы из расчета на максимально рекомендованную ежедневную дозу, его не следует применять пациентам, страдающим редкой наследственной непереносимостью галактозы (галактоземией) в следствие недостаточности лактазы, непереносимости лактозы и синдрома глюкозо-галактозной мальабсорбции. Перед началом приема сообщите своему врачу, если страдаете какими-либо заболеваниями, аллергией или принимаете другие препараты (в том числе и без назначения врача).

Влияние на способность управлять автомобилем и машинным оборудованием не установлено.

При нарушениях функции почек

Противопоказано: почечная недостаточность.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

В плотно закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности. 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Farmaton_Vital