

Фастум гель



Код АТХ:

- [M02AA10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетопрофен](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 2.5% 30 г, 50 г, 100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Состав:

100 г геля для наружного применения 2,5% содержат

Активное вещество: кетопрофен 2,5 г

Вспомогательные вещества: карбомер 940, этанол, масло неролиевое, масло лавандовое, триэтаноламин, вода очищенная.

Описание:

Гель для наружного применения 2.5% бесцветный, почти прозрачный, вязкий, с приятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС для наружного применения. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов. Оказывает местное анальгезирующее, противовоспалительное, антиэкссудативное действие. При симптоматическом лечении заболеваний суставов, сухожилий, связок, мышц, кожи; при суставном синдроме уменьшает боли в суставах в покое и

при движении, утреннюю скованность и отечность суставов.

Фармакокинетика

При местном применении всасывается чрезвычайно медленно. Биодоступность - 5%. При применении в дозе 50-150 мг концентрация в плазме крови составляет 0.08-0.15 мкг/мл. Не кумулирует в организме.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- заболевания опорно-двигательного аппарата (суставной синдром при обострении подагры, ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, воспалительное поражение связок, сухожилий, бурсит, ишиас, люмбаго);
- миалгии ревматического и неревматического происхождения;
- посттравматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата.

Относится к болезням:

- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Артрит](#)
- [Бурсит](#)
- [Воспаление связок](#)
- [Воспаление сухожилий](#)
- [Ишиас](#)
- [Корешковый синдром](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Подагра](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- мокнущие дерматозы, экземы, инфицированные ссадины, раны;
- указания в анамнезе на бронхоспазм, крапивницу или ринит, вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты;
- детский возраст до 12 лет;
- III триместр беременности;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к препарату, ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС.

С осторожностью: применяют при эрозивно-язвенном поражении ЖКТ, выраженных нарушениях функции почек и печени, хронической сердечной недостаточности, бронхиальной астме, печеночной порфирии.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для наружного применения. Небольшое количество геля (столбик длиной 3-5 см) 1-2 раза/сут наносят тонким слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают. Продолжительность курса лечения не должна превышать 14 дней.

Побочное действие:

Местные реакции: аллергический дерматит, экзема, гиперемия кожи, фотодерматит, буллезный дерматит, экзантема, пурпура.

Фастум гель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Системные реакции: крапивница, генерализованная кожная сыпь, отеки, фотосенсибилизация, стоматит.

Передозировка:

В связи с крайне низкой системной абсорбцией передозировка препарата маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в III триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания). В I и II триместрах препарат применяют с осторожностью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания геля на открытые раны, воспаленную кожу, слизистые оболочки и в глаза.

После нанесения геля необходимо сразу же вымыть руки.

Препарат нельзя применять с окклюзионными (воздухонепроницаемыми) повязками.

Нет данных о влиянии препарата на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fastum_gel