

## Файберлекс



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Подорожника овального семян оболочка](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь**, состоящий из желтовато-белого цвета, хрупких, различной формы кусочков семенной оболочки (наружный слой), длиной до 3 мм и шириной до 1.5 мм, с включениями различной формы и цвета других частей семени; проходящий сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм.

	<b>1 саше</b>
оболочка семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.)	5 г

Вспомогательные вещества: аспартам.

5.15 г - саше из фольги трехслойной (10) - коробки картонные.

**Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый)**, состоящий из желтовато-белого цвета, хрупких, различной формы кусочков семенной оболочки (наружный слой), длиной до 3 мм и шириной до 1.5 мм, с включениями различной формы и цвета других частей семени; проходящий сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм; со специфическим апельсиновым запахом, усиливающимся при растирании порошка.

	<b>1 саше</b>
оболочка семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.)	5 г

Вспомогательные вещества: аспартам, ароматизатор апельсиновый O-1-15617-J-71.

5.3 г - саше из фольги трехслойной (10) - коробки картонные.

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (фруктовый)**, состоящий из желтовато-белого цвета, хрупких, различной формы кусочков семенной оболочки (наружный слой), длиной до 3 мм и шириной до 1.5 мм, с включениями различной формы и цвета других частей семени; проходящий сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм; со специфическим фруктовым запахом, усиливающимся при растирании порошка.

	<b>1 саше</b>
оболочка семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.)	5 г

Вспомогательные вещества: аспартам, ароматизатор фруктовый "Тропический фруктовый PDF-214".

5.3 г - саше из фольги трехслойной (10) - коробки картонные.

### Фармакологические свойства:

**Фармакодинамика**

Слабительный препарат. Действие препарата обусловлено раздражением рецепторов слизистой оболочки кишечника за счет увеличения объема содержимого кишечника в результате абсорбции воды препаратом.

**Фармакокинетика**

В соответствии с Международной конвенцией (ЕМЕАНPWG11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

**Показания к применению:**

- острый и хронический запор;
- анальные трещины;
- геморрой;
- послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области (для размягчения стула).

**Относится к болезням:**

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Запор](#)

**Противопоказания:**

- кишечная непроходимость;
- патологические сужения ЖКТ;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 18 лет);
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают по 1 саше за 30 мин до еды. Необходимо смешать содержимое 1 саше с 200 мл теплой или холодной воды и медленно выпить.

Курс лечения при *острых запорах* - 1-2 дня (до исчезновения запора); при *хронических запорах* - до 4-х недель, после недельного перерыва возможно проведение повторного курса; при *анальных трещинах и геморрое* - до 4-х недель, до достижения отсутствия дискомфорта при дефекации, после недельного перерыва возможно проведение повторного курса; в *послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области* - по рекомендации врача (до 4-х недель).

**Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции.

**Передозировка:**

Данные о передозировке не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат за счет незначительных абсорбционных свойств и за счет ускорения опорожнения кишечника может незначительно снижать или задерживать всасывание в ЖКТ других препаратов, принятых одновременно с ним.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Неправильный прием препарата (с недостаточным количеством жидкости или без жидкости) может привести к раздражению пищевода или кишечника, особенно у пожилых пациентов. При приеме препарата следует выпить не менее 1.5-2 л жидкости в сутки.

### ***Применение в пожилом возрасте***

Неправильный прием препарата (с недостаточным количеством жидкости или без жидкости) может привести к раздражению пищевода или кишечника, особенно у пожилых пациентов.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст (до 18 лет).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не применять по окончании срока годности.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fayberleks>