

Фемилекс (свечи)



Код АТХ:

- [G01AD01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Молочная кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные, 100 мг. В контурной ячейковой упаковке, 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Состав:

Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
молочная кислота	100 мг
(в пересчете на 100% вещество)	
<i>основа для суппозитория</i> — достаточное количество до получения суппозитория массой 3 г: макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) — 92-98%; макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) — 8-2%	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антисептическое.

Показания к применению:

— нормализация нарушенной микрофлоры и pH влагалища, в т.ч. при бактериальном вагинозе (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)

Противопоказания:

- кандидозный вульвовагинит;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст (до 18 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки. Один вагинальный суппозиторий вводят во влагалище (лежа на спине при слегка согнутых ногах) 1 раз/сут. Курс лечения - 10 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, зуд, в единичных случаях - жжение во влагалище, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности противопоказано, т.к. клинические исследования у беременных не проводились.

Сведения о проникновении в грудное молоко отсутствуют. Применение в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет сведений.

Особые указания и меры предосторожности:

При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции влагалища.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Femileks_svechi