Фемилекс (свечи)



Код АТХ:

- G01AD01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Молочная кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные, 100 мг. В контурной ячейковой упаковке, 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Состав:

Суппозитории вагинальные	1 супп.
активное вещество:	
молочная кислота	100 мг
(в пересчете на 100% вещество)	
основа для суппозиториев — достаточное количество до получения суппозитория массой 3 г: макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) — 92–98%; макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) — 8–2%	

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антисептическое.

Показания к применению:

— нормализация нарушенной микрофлоры и pH влагалища, в т.ч. при бактериальном вагинозе (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Вагинит

Противопоказания:

— кандидозный вульвовагинит;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— детский возраст (до 18 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки. Один вагинальный суппозиторий вводят во влагалище (лежа на спине при слегка согнутых ногах) 1 раз/сут. Курс лечения - 10 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, зуд, в единичных случаях - жжение во влагалище, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности противопоказано, т.к. клинические исследования у беременных не проводились.

Сведения о проникновении в грудное молоко отсутствуют. Применение в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет сведений.

Особые указания и меры предосторожности:

При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции влагалища.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Femileks_svechi