Фенхеля обыкновенного плоды

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фенхеля обыкновенного плоды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное***	**1 пачка**
плоды фенхеля обыкновенного	50 г

Пачки картонные с вложением пакетов полипропиленовых.

◊ ***Сырье растительное***	**1 пачка**
плоды фенхеля обыкновенного	100 %

пакеты (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой фенхеля плодов. Оказывает ветрогонное, спазмолитическое, а также отхаркивающее действие. Обладает слабыми диуретическими свойствами, способствует усилению лактации. Фармакологические свойства препарата обусловлены, в значительной степени, рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний ЖКТ и дыхательных путей.

Показания к применению:

— метеоризм (в качестве ветрогонного средства);

— кишечная колика;

— отхаркивающее средство в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (трахеит, бронхит, пневмония, коклюш).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Кишечная колика

- Кишечные колики
- Коклюш
- Пневмония
- Трахеит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Около 10 г (1.5 столовые ложки) плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Настой принимают внутрь в теплом виде 3-4 раза/сут:

взрослые и дети старше 12 лет - по 1/3 стакана;

дети от 7 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки;

дети от 3 до 6 лет - по 1 столовой ложке;

дети до 3-х лет - по 1/2-1 чайной ложке.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

дети от 7 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки;

дети от 3 до 6 лет - по 1 столовой ложке;

дети до 3-х лет - по 1/2-1 чайной ложке.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте. Готовый настой следует хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fenhelya_Obyknovennogo_Plody