Фенистил 24

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы пролонгированного действия***	**1 капс.**
диметиндена малеат	4 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал прежелатинизированный, глютаминовая кислота, силиконовая эмульсия Е-2, метилгидроксипропилцеллюлоза, титана диоксид, тальк, эудражит ECD-30, водорастворимое покрытие ECD-30, железа оксид красный, железа оксид желтый, желатин.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H_1-рецепторов. Оказывает противоаллергическое и противозудное действие. Значительно уменьшает повышенную проницаемость капилляров, связанную с аллергическими реакциями. Блокирует действие кининов, обладает слабым антихолинергическим действием, может вызывать небольшой седативный эффект. Противорвотного действия не оказывает.

При профилактическом приеме препарата отмечается уменьшение выраженности симптомов сенной лихорадки.

Фармакокинетика

Всасывание

После однократного приема внутрь 1 капсулы пролонгированного действия C_{max} активного вещества в плазме крови достигается в течение 7-12 ч.

Распределение

В диапазоне концентраций диметиндена в плазме 0.09-2 мкг/мл его связывание с белками плазмы составляет около 90%.

При курсовом применении по 1 капсуле 1 раз/сут кинетика диметиндена имеет линейный характер. Кумуляции не наблюдается.

Метаболизм

Метаболические реакции включают гидроксилирование и метоксилирование.

Выведение

После однократного приема внутрь 1 капсулы $T_{1/2}$ составляет около 11 ч. Диметинден и его метаболиты выводятся почками и с желчью.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение аллергических кожных реакций (в т.ч. крапивницы);

— симптоматическое лечение сезонного (сенная лихорадка) и круглогодичного аллергического ринита;

— зуд, связанный с зудящими дерматозами (в т.ч. экзема);

— пищевая и лекарственная аллергия;

— профилактическая гипосенсибилизирующая терапия.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Дерматит
- Зуд
- Крапивница
- Лихорадка
- Ринит
- Сенная лихорадка
- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к диметиндену и другим компонентам, входящим в состав препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при повышенном внутриглазном давлении, бронхиальной астме, гипертиреозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (в т.ч. артериальная гипертензия).

Следует соблюдать особую осторожность при применении препарата при стенозирующей язве желудка, пилородуоденальной обструкции, обструкции шейки мочевого пузыря, гипертрофии предстательной железы, сопровождающейся задержкой мочи.

Способ применения и дозы:

Взрослым и **детям в возрасте 12 лет и старше** назначают по 1 капсуле 1 раз/сут. Капсулу следует принимать вечером. Глотать целиком, не разжевывая. При сменном графике работы препарат следует принимать перед сном. Продолжительность лечения не должна превышать 25 дней.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: иногда - чувство усталости, преходящая сонливость, головная боль, головокружение; в редких случаях - возбуждение.

Со стороны пищеварительной системы: иногда - желудочно-кишечные нарушения (в т.ч. тошнота), сухость во рту.

Прочие: редко - отеки, кожная сыпь, мышечный спазм, нарушения дыхания.

Передозировка:

При передозировке Фенистила 24, как и при передозировке других блокаторов гистаминовых H_1-рецепторов, возможны следующие *симптомы:* угнетение ЦНС и сонливость (в основном у взрослых), стимуляция ЦНС и антихолинергические эффекты (особенно у детей), в т.ч. возбуждение, атаксия, тахикардия, галлюцинации, тонико-клонические судороги, мидриаз, сухость во рту, покраснение лица, задержка мочи, лихорадка. Также возможна артериальная гипотензия. В далеко зашедших случаях возможно углубление комы с угнетением сосудодвигательного и дыхательного центров и летальным исходом.

О случаях летального исхода при передозировке Фенистила 24 не сообщалось.

Лечение: следует предпринять обычные меры неотложной помощи: вызвать рвоту; если это не удается - провести промывание желудка, назначить активированный уголь, солевое слабительное; провести мероприятия по поддержанию функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем (аналептические средства не должны применяться). Для лечения артериальной гипотензии можно применять сосудосуживающие средства. .

Специфического антидота в случае передозировки диметиндена нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Фенистила 24 при беременности возможно только по жизненным показаниям и под наблюдением врача.

Назначать препарат кормящей матери в период лактации не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном назначении Фенистила 24 и препаратов, угнетающих ЦНС, таких как транквилизаторы, снотворные средства, средства для наркоза возможно усиление седативного действия этих препаратов.

При одновременном применении Фенистила 24 и антидепрессантов - ингибиторов МАО (в т.ч. ниаламида) возможно усиление их антихолинергического действия и угнетающего влияния на ЦНС.

При одновременном применении Фенистила 24 и трициклических антидепрессантов (в т.ч. амитриптилина, имипрамина), а также антихолинергических средств (в т.ч. атропина, скополамина) возможно усиление антихолинергического эффекта.

При одновременном применении этанола и диметиндена усиливается угнетающее действие на ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применение Фенистила 24 у больных с бронхиальной астмой.

Не следует применять Фенистил 24 одновременно с антидепрессантами-ингибиторами МАО (в т.ч. с ниаламидом).

Использование в педиатрии

Фенистил 24 не рекомендуется назначать **детям младше 12 лет**. Этой категории пациентов показан диметинден в форме капель.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не рекомендуется назначать препарат пациентам, деятельность которых требует повышенной концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций (вождение автомобиля, работа с механизмами).

Применение в детском возрасте

Фенистил 24 не рекомендуется назначать **детям младше 12 лет**. Этой категории пациентов показан диметинден в форме капель.

Условия хранения:

Препарат следует хранить сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fenistil_24