Фенистил Пенцивир



Код АТХ:

- D06BB06

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пенцикловир

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения 1%*** однородный, белого цвета.

	1 г
пенцикловир	10 мг

Вспомогательные вещества: цетомакрогол 1000 - 9.4 мг, цетостеариловый спирт - 77.2 мг, парафин белый мягкий - 148.5 мг, масло вазелиновое (парафин жидкий) - 59.4 мг, пропиленгликоль - 416.8 мг, вода очищенная - 278.7 мг.

2 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
2 г - тубы алюминиевые (1) - пеналы пластиковые в комплекте с зеркалом и аппликаторами (20 шт.).
5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
5 г - тубы алюминиевые (1) - пеналы пластиковые в комплекте с зеркалом и аппликаторами (20 шт.).

◊ ***Крем для наружного применения (с тонирующим эффектом) 1%*** однородный, от бежевого до коричневого цвета.

	1 г
пенцикловир	10 мг

Вспомогательные вещества: цетомакрогол 1000 - 9.4 мг, цетостеариловый спирт - 77.2 мг, парафин белый мягкий - 148.5 мг, масло вазелиновое (парафин жидкий) - 59.4 мг, пропиленгликоль - 415.55 мг, вода очищенная - 277.45 мг, краситель железа оксид красный - 1.7 мг, краситель железа оксид желтый - 0.8 мг.

2 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный препарат для наружного применения. Пенцикловир - противовирусный препарат, активен в отношении вирусов Herpes simplex 1 и 2 типа, вируса Varicella zoster. Вирус может находиться в неактивной форме в организме в течение продолжительного периода времени. В момент активации (например, вследствие усталости, простуды, гриппа) вирус начинает размножаться, что приводит к развитию лихорадки в виде пузырьковых высыпаний, особенно часто это наблюдается на губах или на участках вокруг них. Пенцикловир блокирует вирус и останавливает его размножение. Применение препарата приводит к более быстрому выздоровлению, уменьшению интенсивности болевых ощущений, сокращается период риска передачи вирусной инфекции.

Фармакокинетика

При наружном применении препарат практически не подвергается системной абсорбции. Современными аналитическими методами не удается выявить пенцикловир в крови или моче здоровых добровольцев после применения крема Фенистил Пенцивир в дозах, во много раз превышающих терапевтические.

Проникая в пораженные вирусом клетки, пенцикловир быстро переходит в пенцикловира трифосфат, обладающий фармакологической активностью и сохраняющийся в пораженных клетках в течение 12 ч.

Показания к применению:

— рецидивирующий простой герпес с локализацией на губах (herpes labialis).

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к пенцикловиру, фамцикловиру или к другим компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

Взрослым и **детям в возрасте 12 лет и старше**: небольшой объем крема выдавливают на кончик пальца и наносят на пораженный участок каждые 2 ч (примерно 8 раз/сут). Курс терапии проводится в течение 4 дней.

Крем также можно наносить при помощи ватного тампона или одноразового аппликатора (для упаковок, содержащих аппликаторы).

Крем для наружного применения с тонирующим эффектом обладает маскирующими свойствами, маскирует пораженные герпесом участки на губах и на коже вокруг рта.

Побочное действие:

Местные реакции: возможны жжение, пощипывание или онемение сразу же после нанесения препарата.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по строгим показаниям в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Какие-либо лекарственные взаимодействия для крема Фенистил Пенцивир не известны.

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо тщательно вымыть руки до и после нанесения крема.

Лечение следует начинать как можно раньше, при появлении первых признаков развития инфекции. Тем не менее, даже при развитии герпеса в стадии пузырьков применение крема Фенистил Пенцивир сокращает время вылечивания (залечивает пораженные участки, уменьшает болевые ощущения и укорачивает продолжительность периода шелушения корки, образовавшейся от вирусного воздействия).

У пациентов с ослабленным иммунитетов или если проявления заболевания носят неопределенный характер, необходимость применения препарат врач решает индивидуально.

Препарат следует использовать только на пораженных герпесом участках на губах и на коже вокруг рта. Не рекомендуется наносить крем на слизистую оболочку полости рта, носа или в области глаз и половых органов.

Необходимо проводить полный курс терапии с применением крема Фенистил Пенцивир в течение 4 дней, для того чтобы добиться наибольшего эффекта от проводимой терапии, даже если признаки инфекции исчезают после одного-двух дней лечения.

При ухудшении состояния или при отсутствии улучшения после 4 дней проведения терапии пациент должен обратиться к лечащему врачу

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С; не замораживать.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fenistil_Pencivir