

Фенистил (эмульсия)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Фенистил (эмульсия)



Код АТХ:

- [R06AB03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диметинден](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Эмульсия для наружного применения** беловатого цвета, гомогенная, полужидкая, с легким запахом бензилового спирта.

	1 г
диметиндена малеат	1 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0.1 мг, бензиловый спирт - 5 мг, бутилгидрокситолуол - 0.2 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, кокоил каприлокапрат - 25 мг, парафин жидкий - 25 мг, цетостеаромакрогол - 20 мг, карбомер около - 4 мг, натрия гидроксида раствор 30% м/м - около 4 мг, пропиленгликоль - 150 мг, вода - около 765.2 мг.

8 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антигистаминное, противоаллергическое и противозудное средство. Блокатор H₁-гистаминовых рецепторов, является конкурентным антагонистом гистамина. Препарат снижает повышенную проницаемость капилляров, связанную с аллергическими реакциями. При нанесении на кожу эмульсия Фенистил® уменьшает зуд и раздражение, вызванные кожно-аллергическими реакциями, что обусловлено антикининовым и антихолинергическим действием препарата.

Фенистил эмульсия обладает также выраженным местноанестезирующим эффектом. При местном применении препарат быстро проникает в кожу и обеспечивает быстрое начало действия - через несколько минут. Эмульсионная основа препарата обеспечивает охлаждающее, смягчающее и увлажняющее свойства препарата.

Фармакокинетика

При местном применении хорошо проникает в кожу, системная биодоступность - около 10%.

Показания к применению:

Кожный зуд различного происхождения (кроме связанного с холестаазом):

- зудящие дерматозы;
- экзема;
- крапивница;
- укусы насекомых, солнечные ожоги, бытовые и производственные ожоги (легкой степени).

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Крапивница](#)
- [Ожоги](#)
- [Холера](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к диметиндену и другим компонентам, входящим в состав препарата;
- закрытоугольная глаукома;
- гиперплазия предстательной железы;
- детский возраст до 1 месяца, особенно недоношенные дети.

С осторожностью

Беременность I триместр, период лактации.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно.

Эмульсию наносят от 2 до 4 раз в день на пораженные участки кожи.

Побочное действие:

Очень часто — более 1/10 назначений ($\geq 10\%$); часто — более 1/100, но менее 1/10 назначений ($\geq 1\%$, но $\leq 10\%$); нечасто — более 1/1000, но менее 1/100 назначений ($\geq 0.1\%$, но $\leq 1\%$); редко — более 1/10000, но менее 1/1000 назначений ($\geq 0.01\%$, но $\leq 0.1\%$); очень редко — менее 1/10000 назначений ($\leq 0.01\%$).

Со стороны кожи и подкожных тканей: редко - сухость, жжение кожи; очень редко - кожная сыпь, зуд.

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

При случайном приеме внутрь больших доз препарата следует проводить обычные поддерживающие мероприятия (прием активированного угля, солевых слабительных и др. меры), поскольку специфического антидота для данной группы препаратов не существует.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в первые три месяца беременности возможно только после консультации с врачом. Во II и III триместрах беременности, а также в период лактации эмульсию Фенистил® не следует применять на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления или кровоточивости. Кормящим матерям не следует наносить препарат на соски молочных желез.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

У младенцев и детей младшего возраста не следует применять препарат на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления или кровоточивости. При выраженном зуде или при поражении обширных участков кожи препарат можно применять только после консультации с врачом.

При применении эмульсии Фенистил® на обширных участках кожи следует избегать продолжительного воздействия солнечных лучей.

Если в период применения эмульсии Фенистил® выраженность симптомов заболевания не уменьшается или, напротив, усиливается, необходимо обратиться к врачу. Неэффективен при зуде, связанном с холестазом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Применяют по показаниям. Не назначают детям в возрасте до 1 мес, особенно недоношенным.

У младенцев и детей младшего возраста не следует применять препарат на обширных участках кожи, особенно при наличии явлений воспаления или кровоточивости. При выраженном зуде или при поражении обширных участков кожи препарат можно применять только после консультации с врачом.

Условия хранения:

При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fenistil_emulsiya