# Фенкарол (раствор)



## Код АТХ:

- R06AX

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хифенадин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Раствор для в/м введения*** прозрачный, бесцветный.

| | **1 мл** |
|---|---|
| хифенадин (фенкарол основание) | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* глутаминовая кислота - 6.26 мг, вода д/и - до 1 мл.

1 мл - ампулы (10) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Интермедианты

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Блокатор гистаминовых $H_1$-рецепторов. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Оказывает противоаллергическое, антиэкссудативное и противозудное действие, предотвращая развитие аллергического воспаления в ткани. Ослабляет действие гистамина, уменьшает его влияние на проницаемость сосудов (снижая проницаемость, оказывает противоотечный эффект), снижает его бронхоспастическое действие и спазмогенное влияние на гладкую мускулатуру кишечника, ослабляет гипотензивное действие гистамина. Хифенадин уменьшает содержание гистамина в тканях, что связано со способностью активировать диаминооксидазу - фермент, инактивирующий гистамин. При курсовом лечении антигистаминное действие хифенадина не снижается. Обладает умеренным антисеротониновым действием, проявляет слабую м-холиноблокирующую активность. Не оказывает угнетающего влияния на ЦНС.

***Фармакокинетика***

*Всасывание и распределение*

После в/м введения раствор быстро всасывается, $C_{max}$ хифенадина в плазме крови достигается через 30 мин.

Хифенадин обладает низкой липофильностью, плохо проникает через ГЭБ. Самое высокое содержание активного вещества отмечено в печени, несколько меньше - в легких и почках, самое низкое - в головном мозге (меньше 0.05%, что объясняет отсутствие выраженного седативного и снотворного эффекта).

*Метаболизм и выведение*

Препарат метаболизируется в печени, образуя неактивные метаболиты, которые выводятся преимущественно почками.

## Показания к применению:

— поллиноз;

— крапивница;

— ангионевротический отек (отек Квинке) в случае тяжелого течения и необходимости в/м применения антигистаминных препаратов.

## Относится к болезням:

- Ангина
- Ангионевротический отек
- Крапивница
- Поллиноз

## Противопоказания:

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— индивидуальная непереносимость хифенадина;

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

*С осторожностью* следует применять препарат при декомпенсированных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, печени и почек.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют в/м. Из-за раздражающего действия не следует вводить препарат п/к.

*Поллиноз*

По 2 мл (20 мг) 2 раза/сут в течение 3 дней, далее по 2 мл (20 мг) 1 раз/сут в течение 2 дней. Общая продолжительность лечения - 5 дней. Максимальная разовая доза - 20 мг; максимальная суточная доза - 40 мг.

*Крапивница и ангионевротический отек (отек Квинке)*

По 2 мл (20 мг) 2 раза/сут в течение 5 дней, далее по 2 мл (20 мг) 1 раз/сут в течение 3 дней. Общая продолжительность лечения - 8 дней. Максимальная разовая доза - 20 мг; максимальная суточная доза - 40 мг.

После купирования острых аллергических реакций рекомендуется перейти на применение препарата Фенкарол в форме таблеток.

## Побочное действие:

Препарат переносится хорошо.

*Возможно:* редко - сухость во рту, тошнота, рвота, сонливость, аллергические реакции, головная боль.

## Передозировка:

*Симптомы:* сухость слизистых оболочек, головная боль, рвота, боли в животе и другие диспепсические явления.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии. Пациенту следует принять активированный уголь, немедленно обратиться к врачу.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять препарат при беременности.

При необходимости лечения препаратом грудное вскармливание следует прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не усиливает угнетающее действие этанола и снотворных препаратов на ЦНС.

Обладая слабыми м-холиноблокирующими свойствами, может снижать моторику ЖКТ и увеличивать всасывание медленно абсорбирующихся лекарственных средств (например, антикоагулянты непрямого действия - производные кумарина).

## Особые указания и меры предосторожности:

Отсутствие выраженного холиноблокирующего эффекта позволяет назначать препарат пациентам, которым противопоказаны антигистаминные препараты, обладающие антихолинергической активностью.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Лицам, профессия которых требует повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, следует предварительно определить (путем краткосрочного назначения), не оказывает ли препарат седативного эффекта.

***При нарушениях функции почек***

*С осторожностью* следует применять препарат при декомпенсированных заболеваниях почек.

***При нарушениях функции печени***

*С осторожностью* следует применять препарат при декомпенсированных заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказано применение препарата в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Fenkarol_rastvor