Фенюльс



Код АТХ:

- B03AE03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы***	**1 капс.**
железа сульфат	150 мг,
в т.ч. железо	45 мг
аскорбиновая кислота	50 мг
рибофлавин	2 мг
тиамина мононитрат	2 мг
никотинамид	15 мг
пиридоксина гидрохлорид	1 мг
пантотеновая кислота	2.5 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат железа с комплексом витаминов, для приема внутрь, находящийся в капсуле, которая содержит микродиализные гранулы и обеспечивает постепенное выделение составных частей.
Препарат применяется при хронической кровопотере, алиментарной недостаточности железа, повышенной потребности в железе.
Железо необходимо для нормального функционирования гемоглобина, миоглобина, цитохромов, пероксидаз и каталаз. Являясь структурным компонентом гема, принимает участие в гемопоэзе.
Наличие в микродиализных гранулах в комплексе с железом аскорбиновой кислоты и витаминов группы В улучшает всасывание железа, предупреждает прооксидантное действие железа.
Тиамин участвует в качестве кофактора ферментов в углеводном обмене, функционировании нервной системы.
Никотинамид участвует в клеточном дыхании.
Рибофлавин — важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.
Пиридоксин в качестве коэнзима участвует в метаболизме аминокислот, белков, синтезе нейромедиаторов.
Кальция пантотенат — составная часть коэнзима А, участвует в процессах ацетилирования и окисления жиров и углеводов.
Витамины восстанавливают нарушенный метаболизм углеводов, белков и жиров при развитии дистрофических нарушений в организме, вызванных скрытым дефицитом железа и авитаминозом.

Показания к применению:

— лечение и профилактика скрытого дефицита железа на фоне обильных и/или длительных менструаций, беременности, лактации;

— гиповитаминозы группы В.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— гемохроматоз;

— гемосидероз;

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

При *скрытом дефиците железа* — по 1 капс. 1 раз/сут. Курс лечения — 1 мес.
Для *профилактики скрытого дефицита железа* (при обильных и длительных менструациях) — по 1 капс. за 1–2 дня до начала, во время и 1–2 дня после окончания менструации.

Побочное действие:

Аллергические реакции, рвота, запоры или диарея, боль в области эпигастрия, головокружение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применяют по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Не следует назначать одновременно с антацидами, содержащими соли алюминия, магния, кальция, т.к. уменьшается всасывание железа.

Железо уменьшает абсорбцию препаратов тетрациклинового ряда.

Пиридоксин уменьшает терапевтический эффект леводопы.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что не имеет клинического значения и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.

Лечение железодефицитной анемии необходимо проводить под контролем уровня гемоглобина и концентрации железа в сыворотке крови.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Хранить в сухом, темном, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fenyuls