Ферри-Фол



Код АТХ:

- B03AD

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Железа (III) гидроксид полимальтозат
- Фолиевая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, стимулирует эритропоэз при железодефицитной анемии.

Fe^{3+} находится в форме сложного гидроксид полимальтозного комплекса, который состоит из центральной решетки, образованной ядрами Fe^{3+} и окруженной большим числом молекул полимальтозы; не обладает прооксидантными свойствами, снижает окисление ЛПНП и ЛПОНП.

Фолиевая кислота - витамин группы В, стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, в обмене холина.

Показания к применению:

— железодефицитная анемия (в т.ч. на фоне беременности, в период лактации).

Относится к болезням:

- Железодефицитная анемия

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— гемохроматоз;

— гемосидероз.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут, во время или сразу после еды, до нормализации показателей гемоглобина, затем продолжают прием по 1 таб./сут до окончания беременности (или лактации).

Для *профилактики анемии* - 1 таб./сут.

Длительность *лечения* - не менее 2 мес, *поддерживающей терапии* - до 2-3 мес.

Побочное действие:

Диспепсия (ощущение переполнения и давления в эпигастральной области, тошнота, рвота, запор или диарея), темная окраска кала (обусловлена выведением невсосавшегося железа и не имеет клинического значения), аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ferri-Fol