

Ферри-Фол



Код АТХ:

- [B03AD](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Железа \(III\) гидроксид полимальтозат](#)
- [Фолиевая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, стимулирует эритропоэз при железодефицитной анемии.

Fe³⁺ находится в форме сложного гидроксид полимальтозного комплекса, который состоит из центральной решетки, образованной ядрами Fe³⁺ и окруженной большим числом молекул полимальтозы; не обладает прооксидантными свойствами, снижает окисление ЛПНП и ЛПОНП.

Фолиевая кислота - витамин группы В, стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, в обмене холина.

Показания к применению:

— железодефицитная анемия (в т.ч. на фоне беременности, в период лактации).

Относится к болезням:

- [Железодефицитная анемия](#)

Противопоказания:

Ферри-Фол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- гиперчувствительность;
- гемохроматоз;
- гемосидероз.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 таб. 2-3 раза/сут, во время или сразу после еды, до нормализации показателей гемоглобина, затем продолжают прием по 1 таб./сут до окончания беременности (или лактации).

Для профилактики анемии - 1 таб./сут.

Длительность лечения - не менее 2 мес, поддерживающей терапии - до 2-3 мес.

Побочное действие:

Диспепсия (ощущение переполнения и давления в эпигастральной области, тошнота, рвота, запор или диарея), темная окраска кала (обусловлена выведением невсосавшегося железа и не имеет клинического значения), аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ferri-Fol>