# Ферроплекс



## Код АТХ:

- B03AE03

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аскорбиновая кислота
- Железа сульфат

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства
- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат.

Железа сульфат восполняет недостаток железа в организме, аскорбиновая кислота улучшает его всасывание из ЖКТ.

## Показания к применению:

Железодефицитная анемия (лечение и профилактика), вызванная различными причинами:

— повышенная потребность в железе при беременности и в период лактации, в период интенсивного роста и реконвалесценции после длительных тяжелых заболеваний;

— длительные кровотечения (в т.ч. при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки);

— снижение всасывания железа при хронической диарее;

— неполноценное и несбалансированное питание.

## Относится к болезням:

- Диарея
- Реконвалесценция
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

## Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— повышенное содержание железа в организме (гемосидероз, гемохроматоз);

— нарушение утилизации железа (апластическая анемия);

— состояние после резекции желудка;

— кровотечения;

— детский возраст (до 12 лет - для Сорбифера дурулес).

С *осторожностью:* язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

## Способ применения и дозы:

Драже и таблетки принимают внутрь (не разжевывая), за 30 мин до еды, запивая 100 мл жидкости. После нормализации показателей гемоглобина лечение проводится в течение 1-3 мес до полного насыщения депо железа в организме.

Обычная доза препарата в пересчете на элементарное железо **взрослым** при *лечении* - 100-200 мг/сут, при *профилактике* и *поддерживающей терапии* - 100 мг/сут.

**Детям** - 3 мг/кг/сут.

***Сорбифер дурулес*** (1 таб. содержит 320 мг железа сульфата и 60 мг аскорбиновой кислоты): **взрослым** назначают по 2 таб. 3 раза/сут. При *анемии в I-II триместрах беременности* - 1 таб. 1 раз/сутки, в *III триместре* и *в период лактации* - 1 таб. 2 раза/сут.

***Ферроплекс*** (1 драже содержит 50 мг железа и 30 мг аскорбиновой кислоты): **взрослым** - по 2 драже 3 раза/сут, **детям** - по 1-2 драже 3 раза/сут.

## Побочное действие:

Тошнота, рвота, запоры или диарея, гастралгия, снижение аппетита, кожные аллергические реакции.

## Передозировка:

*Симптомы:* тошнота, рвота, диарея.

*Лечение:* промыть желудок 1% водным раствором натрия гидрокарбоната или назначить дефероксамин; принять внутрь сырые яйца и молоко, что обеспечит связывание ионов железа в ЖКТ и их последующее выведение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Показанием к применению является повышенная потребность в железе при беременности и в период лактации.

При необходимости назначения препарата следует внимательно изучить инструкцию.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимно уменьшают всасывание при совместном применении тетрациклины, D-пеницилламин, чай, яичный желток.

Антациды, содержащие соли алюминия, магния и кальция, снижают всасывание препаратов железа.

## Особые указания и меры предосторожности:

Эффективен только при железодефицитных анемиях и неэффективен при анемиях другой этиологии.

Избегать одновременного назначения с другими железосодержащими лекарственными средствами (риск передозировки).

Окрашивание кала в темный (черный) цвет на фоне приема железосодержащих препаратов не имеет клинического значения.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет - для Сорбифера дурулес).

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ferropleks