<u>Ферроплекс</u>



Код АТХ:

• B03AE03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аскорбиновая кислота
- Железа сульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ MHH PЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahrn}}$

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Железа сульфат восполняет недостаток железа в организме, аскорбиновая кислота улучшает его всасывание из ЖКТ.

Показания к применению:

Железодефицитная анемия (лечение и профилактика), вызванная различными причинами:

- повышенная потребность в железе при беременности и в период лактации, в период интенсивного роста и реконвалесценции после длительных тяжелых заболеваний;
- длительные кровотечения (в т.ч. при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки);
- снижение всасывания железа при хронической диарее;
- неполноценное и несбалансированное питание.

Относится к болезням:

- Диарея
- Реконвалесценция
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- повышенное содержание железа в организме (гемосидероз, гемохроматоз);
- нарушение утилизации железа (апластическая анемия);
- состояние после резекции желудка;
- кровотечения;
- детский возраст (до 12 лет для Сорбифера дурулес).

С осторожностью: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Драже и таблетки принимают внутрь (не разжевывая), за 30 мин до еды, запивая 100 мл жидкости. После нормализации показателей гемоглобина лечение проводится в течение 1-3 мес до полного насыщения депо железа в организме.

Обычная доза препарата в пересчете на элементарное железо **взрослым** при *лечении* - 100-200 мг/сут, при *профилактике* и *поддерживающей терапии* - 100 мг/сут.

Детям - 3 мг/кг/сут.

Сорбифер дурулес (1 таб. содержит 320 мг железа сульфата и 60 мг аскорбиновой кислоты): **взрослым** назначают по 2 таб. 3 раза/сут. При *анемии в I-II триместрах беременности* - 1 таб. 1 раз/сутки, в *III триместре* и *в период лактации* - 1 таб. 2 раза/сут.

Ферроплекс (1 драже содержит 50 мг железа и 30 мг аскорбиновой кислоты): **взрослым** - по 2 драже 3 раза/сут, **детям** - по 1-2 драже 3 раза/сут.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, запоры или диарея, гастралгия, снижение аппетита, кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: промыть желудок 1% водным раствором натрия гидрокарбоната или назначить дефероксамин; принять внутрь сырые яйца и молоко, что обеспечит связывание ионов железа в ЖКТ и их последующее выведение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Показанием к применению является повышенная потребность в железе при беременности и в период лактации.

При необходимости назначения препарата следует внимательно изучить инструкцию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимно уменьшают всасывание при совместном применении тетрациклины, D-пеницилламин, чай, яичный желток.

Антациды, содержащие соли алюминия, магния и кальция, снижают всасывание препаратов железа.

Особые указания и меры предосторожности:

Эффективен только при железодефицитных анемиях и неэффективен при анемиях другой этиологии.

Избегать одновременного назначения с другими железосодержащими лекарственными средствами (риск передозировки).

Окрашивание кала в темный (черный) цвет на фоне приема железосодержащих препаратов не имеет клинического значения.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет - для Сорбифера дурулес).

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ferropleks