

## Феспален (сироп)



### Код АТХ:

- [R03DX03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенспирид](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Сироп** оранжевого цвета, прозрачный, с характерным запахом; возможно образование осадка, исчезающего при взбалтывании.

	<b>1 мл</b>
фенспирида гидрохлорид	2 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.9 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.35 мг, калия сорбат - 1.9 мг, сорбитол - 852 мг, глицерол - 225 мг, натрия цитрат - 6 мг, лимонной кислоты моногидрат - 1.5 мг, натрия сахаринат - 0.45 мг, ароматизатор медовый - 1 мг, ароматизатор фруктовый - 0.1 мг, краситель солнечный закат желтый - 0.1 мг, вода очищенная - до 1 мл.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.

100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.

150 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.

150 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).

100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).

100 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).

100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).

150 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).

150 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).

150 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).

150 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедянты](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Средство с бронхолитическим и противовоспалительным действием. Уменьшает проявления бронхоспазма и воспаления в дыхательных путях. Механизм действия связан с антагонистической активностью в отношении гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов и с миотропной спазмолитической активностью. Уменьшает продукцию ряда биологически активных веществ, участвующих в развитии воспаления и способствующих повышению тонуса бронхов (в т.ч. цитокинов, ФНОα, производных арахидоновой кислоты, свободных радикалов).

### Фармакокинетика

Хорошо абсорбируется из ЖКТ. C<sub>max</sub> достигается через 6 ч после приема и через 12 ч снижается в 3 раза. Выводится преимущественно почками (90%), через кишечник – 10%. T<sub>1/2</sub> - 12 ч.

## Показания к применению:

Ринофарингит, ларингит, отит, синусит, ринотрахеобронхит, бронхит, поддерживающая терапия изолированной и осложненной бронхиальной астмы, симптомы со стороны дыхательных путей при кори, коклюше, гриппе.

## Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Грипп](#)
- [Коклюш](#)
- [Ларингит](#)
- [Отит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фенспириду, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (для таблеток), детский возраст до 2 лет (для сиропа).

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь до еды. Взрослым - по 80 мг 2-3 раза/сут; детям старше 2 лет (в соответствующей лекарственной форме) - 4 мг/кг/сут.

## Побочное действие:

*Возможно:* умеренно выраженные диспептические явления, тошнота, боли в эпигастрии, сонливость.

*Редко:* умеренная тахикардия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Фенспирид противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

## **Феспален (сироп)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Fespalen\\_sirop](http://drugs.thead.ru/Fespalen_sirop)