Феспален (сироп)



Код АТХ:

- R03DX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фенспирид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Сироп оранжевого цвета, прозрачный, с характерным запахом; возможно образование осадка, исчезающего при взбалтывании.

	1 мл
фенспирида гидрохлорид	2 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0.9 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.35 мг, калия сорбат - 1.9 мг, сорбитол - 852 мг, глицерол - 225 мг, натрия цитрат - 6 мг, лимонной кислоты моногидрат - 1.5 мг, натрия сахаринат - 0.45 мг, ароматизатор медовый - 1 мг, ароматизатор фруктовый - 0.1 мг, краситель солнечный закат желтый - 0.1 мг, вода очищенная - до 1 мл.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.
100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.
150 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.
150 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).
100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).
100 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).
100 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).
150 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).
150 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (2) - коробки картонные (для стационаров).
150 мл - флаконы темного стекла (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).
150 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в компл. с мерной ложкой - пачки картонные (3) - коробки картонные (для стационаров).

Фармакотерапевтическая группа:

- Интермедианты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство с бронхолитическим и противовоспалительным действием. Уменьшает проявления бронхоспазма и воспаления в дыхательных путях. Механизм действия связан с антагонистической активностью в отношении гистаминовых H_1-рецепторов и с миотропной спазмолитической активностью. Уменьшает продукцию ряда биологически активных веществ, участвующих в развитии воспаления и способствующих повышению тонуса бронхов (в т.ч. цитокинов, ФНОα, производных арахидоновой кислоты, свободных радикалов).

Фармакокинетика

Хорошо абсорбируется из ЖКТ. C_{max} достигается через 6 ч после приема и через 12 ч снижается в 3 раза. Выводится преимущественно почками (90%), через кишечник – 10%. $T_{1/2}$ - 12 ч.

Показания к применению:

Ринофарингит, ларингит, отит, синусит, ринотрахеобронхит, бронхит, поддерживающая терапия изолированной и осложненной бронхиальной астмы, симптомы со стороны дыхательных путей при кори, коклюше, гриппе.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Грипп
- Коклюш
- Ларингит
- Отит
- Синусит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фенспириду, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (для таблеток), детский возраст до 2 лет (для сиропа).

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь до еды. Взрослым - по 80 мг 2-3 раза/сут; детям старше 2 лет (в соответствующей лекарственной форме) - 4 мг/кг/сут.

Побочное действие:

Возможно: умеренно выраженные диспептические явления, тошнота, боли в эпигастрии, сонливость.

Редко: умеренная тахикардия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Фенспирид противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Источник: http://drugs.thead.ru/Fespalen_sirop