

Фестал



Код АТХ:

- [A09AA02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гемицеллюлаза](#)
- [Желчи компоненты](#)
- [Панкреатин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Драже** белого цвета, глянцевые, круглые, со слабым запахом ванили.

	1 драже
панкреатин	192 мг
с ферментативной активностью:	
липазы	6000 ЕД FIP
амилазы	4500 ЕД FIP
протеаз	300 ЕД FIP
гемицеллюлаза	50 мг
желчи компоненты	25 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид.

Состав оболочки: целлацефат (целлюлозы ацетатфталат), этилванилин, масло касторовое, сахароза, метилпарагидроксibenзоат (метилпарабен), пропилпарагидроксibenзоат (пропилпарабен), желатин, декстроза (глюкоза) жидкая, тальк, кальция карбонат, акации камедь, глицерол (глицерин), макрогол (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (2) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (4) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (6) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы из алюминиевой фольги (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ферментный препарат. Компенсирует недостаточность секреторной функции поджелудочной железы и желчевыделительной функции печени.

Входящие в состав панкреатина ферменты: амилаза, липаза и протеаза облегчают переваривание углеводов, белков, что способствует более полному их всасыванию в тонком кишечнике.

Фермент гемицеллюлаза способствует расщеплению растительной клетчатки, что также улучшает пищеварительные процессы, уменьшает образование газов в кишечнике.

Экстракт бычьей желчи оказывает желчегонное действие, способствует эмульгированию жиров, улучшает всасывание жиров и жирорастворимых витаминов, увеличивает активность липазы.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

- недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (в т.ч. при хроническом панкреатите, муковисцидозе);
- хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря;
- в составе комбинированной терапии при состояниях после резекции или облучения этих органов, сопровождающихся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом, диареей.

Относится к болезням:

- [Диарея](#)
- [Метеоризм](#)
- [Муковисцидоз](#)
- [Панкреатит](#)

Противопоказания:

- острый панкреатит;
- обострение хронического панкреатита;
- печеночная недостаточность;
- гепатит;
- желтуха механического генеза;
- желчнокаменная болезнь;
- эмпиема желчного пузыря;
- кишечная непроходимость.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством

жидкости.

Взрослым по 1-2 таб. 3 раза/сут. Более высокие дозы назначает врач.

Применение препарата у **детей** по назначению врача.

Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).

По 2 таб. 2-3 раза/сут в течение 2-3 дней перед рентгенологическим или ультразвуковым исследованием.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея, боли в животе, снижение эндогенного синтеза желчных кислот.

При длительном применении в высоких дозах: возможно - гиперурикозурия, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

При применении в высоких дозах у детей: возможно - перианальное раздражение, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Прочие: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с Фесталом усиливается всасывание ПАБК, сульфаниламидов, антибиотиков. Возможно снижение всасывания препаратов железа.

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности Фестала.

Особые указания и меры предосторожности:

При муковисцидозе препарат следует назначать с осторожностью, поскольку доза должна быть адекватна количеству и качеству потребляемой пищи.

При нарушениях функции печени

Противопоказано применение препарата при печеночной недостаточности, гепатите, желтухе механического генеза, желчнокаменной болезни.

Применение в детском возрасте

Применение препарата у **детей** по назначению врача.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Festal>