

Фибралакс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Подорожника овального семян оболочка

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** состоящий из различной формы, от желтовато-белого до светло-коричневого цвета, хрупких кусочков семенной оболочки подорожника овального, из включений различной формы коричневого цвета других частей семени и из включений вспомогательных компонентов; запах, усиливающийся при растирании порошка, специфический - апельсиновый.

	1 пак.
оболочка семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.)	3.53 г

Вспомогательные вещества: сахароза - 0.527 г, натрия алгинат - 0.276 г, натрия ацетат - 0.247 г, мальтодекстрин - 0.193 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.137 г, аспартам - 0.03 г, ароматизатор апельсиновый натуральный - 0.06 г.

- 5 г - Пакетики из комбинированного материала (15) - пачки картонные.
- 5 г - Пакетики из комбинированного материала (20) - пачки картонные.
- 5 г - Пакетики из комбинированного материала (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гидрофильные волокна, содержащиеся в оболочке семян подорожника овального, увеличиваются в объеме за счет поглощения воды и вызывают рефлекторное усиление моторики, восстанавливая нормальную деятельность толстого кишечника. Гельобразующая фракция способствует размягчению стула и действует в виде «смазки», облегчая опорожнение кишечника при запорах и болезненной дефекации у пациентов с перианальными поражениями.

Показания к применению:

- острый и хронический запор;
- анальные трещины;
- геморрой;
- послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области (в целях создания более мягкой

консистенции стула).

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Запор](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- органические сужения желудочно-кишечного тракта;
- кишечная непроходимость;
- боли в животе неясного генеза;
- дефицит сахаразы-изомальтазы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- детский возраст до 18 лет;
- фенилкетонурия.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

По 1 пакетику 1-3 раза в сутки за 30 минут до еды или спустя 2 часа после еды. Перед употреблением содержимое 1 пакетика залить стаканом холодной воды, размешать и сразу выпить, затем запить еще одним стаканом жидкости. Курс лечения: при острых запорах - до исчезновения запора (1-2 дня); при хронических запорах - до 4-х недель, после недельного перерыва возможно повторение курса; при анальных трещинах и геморрое — до достижения отсутствия дискомфорта при дефекации (до 4-х недель, после недельного перерыва возможно повторение курса); в послеоперационный период при вмешательствах в аноректальной области - по рекомендации врача (до 4-х недель).

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

В первые дни лечения возможно появление чувства переполнения в животе.

Передозировка:

Случаев передозировки не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует назначать одновременно с противодиарейными препаратами, а также с препаратами, угнетающими моторику кишечника.

Фибралакс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Фибралакс может замедлить всасывание одновременно применяемых лекарственных средств. Следует соблюдать интервал в 30-60 мин между приемом Фнбралакса и других препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме препарата следует выпивать не менее 1,5 л жидкости в сутки. Неправильная процедура приема (с недостаточным количеством жидкости) может привести к раздражению пищевода или кишечника, особенно у пожилых людей. У пациентов с инсулинзависимым сахарным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Fibralaks>