

Фибринолизин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фибринолизин \(человека\)](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фибринолитическое средство. Физиологический компонент естественной противосвертывающей системы. Оказывает прямое фибринолитическое действие. Стимулирует как тканевой фибринолиз (растворение тромба), так и системный фибринолиз (разрушение фибриногена), в результате чего при его использовании могут развиваться гипофибриногемия и кровотечение. При назначении фибринолизина лизис фибринового сгустка осуществляется снаружи, поскольку средство не способно проникать внутрь организованного тромба.

Показания к применению:

Тромбоэмболия легочной артерии, тромбоэмболия сосудов головного мозга, инфаркт миокарда, острый тромбофлебит, обострение хронического тромбофлебита.

Относится к болезням:

- [Миокардит](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Тромбоэмболия](#)

Противопоказания:

Геморрагический диатез, кровотечения, открытые раны, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нефрит, гипофибриногемия, туберкулез (острая форма), лучевая болезнь, повышенная чувствительность к фибринолизину.

Способ применения и дозы:

В/в (капельно) в 0.9% растворе натрия хлорида (100-160 ЕД на 1 мл раствора) с добавлением гепарина (из расчета 10

Фибринолизин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

тыс.ЕД на каждые 20 тыс.ЕД фибринолизина). Суточная доза фибринолизина - до 20-40 тыс.ЕД. Продолжительность введения - 3-4 ч.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, кровотечение.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нефрите.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Fibrinolizin>