

## Фильтрум-СТИ



### Код АТХ:

- [A07BC](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лигнин гидролизный](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[PLS VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки** темно-коричневого цвета с серовато-коричневыми вкраплениями, двояковыпуклые, капсуловидной формы, с риской.

	<b>1 таб.</b>
лигнин гидролизный	400 мг

*Вспомогательные вещества:* повидон К17 (поливинилпирролидон) - 41 мг, кальция стеарат - 4 мг, кроскармеллоза натрия - 5 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Энтеросорбент природного происхождения. Состоит из продуктов гидролиза компонентов древесины - полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.

Обладает высокой сорбционной активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. В просвете ЖКТ Фильтрум-СТИ связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, этанол, пищевые аллергены. Препарат сорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ (в т.ч. билирубина, холестерина, мочевины), метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.

Фильтрум-СТИ не токсичен и не абсорбируется из ЖКТ.

#### **Фармакокинетика**

При приеме внутрь препарат не всасывается и полностью выводится через кишечник в течение 24 ч.

### **Показания к применению:**

В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения:

- острых отравлениях лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами;
- в составе комплексной терапии при пищевых токсикоинфекциях, сальмонеллезе, дизентерии, диспепсии;
- гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией;
- гипербилирубинемии и гиперазотемии (печеночной и почечной недостаточности);
- пищевой и лекарственной аллергиях;
- с целью профилактики хронических интоксикаций у работников вредных производств.

### **Относится к болезням:**

- [Аллергия](#)
- [Дизентерия](#)
- [Диспепсия](#)
- [Интоксикация](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Токсикоз](#)

### **Противопоказания:**

- обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- атония кишечника;
- индивидуальная непереносимость препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат следует принимать внутрь, желателно после предварительного измельчения, запивая водой, за 1 ч до еды и приема других лекарственных препаратов.

Доза препарата зависит от тяжести заболевания, возраста и массы тела пациента.

<b>Возраст пациента</b>	<b>Средняя разовая доза</b>
до 1 года	1/2 таб.
от 1 года до 3 лет	1/2-1 таб.
от 4 лет до 7 лет	1 таб.

## Фильтрум-СТИ

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

от 7 лет до 12 лет	1-2 таб.
от 12 лет и старше	2-3 таб.

Кратность приема препарата - 3-4 раза/сут.

При необходимости по рекомендации врача суточная доза может быть увеличена до 20-30 г в 3-4 приема.

Продолжительность лечения при острых состояниях - 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях - 14-21 день.

Повторные курсы лечения - через 2 недели по рекомендации врача.

### Побочное действие:

*Редко:* аллергические реакции, запор.

При длительном применении возможно нарушение всасывания витаминов, кальция.

### Передозировка:

Данные о передозировке препарата не известны.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата Фильтрум-СТИ при беременности и в период лактации отсутствуют.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно применяемых лекарственных средств.

При соблюдении правил раздельного приема препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами.

### Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении препарата рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

#### **Применение в детском возрасте**

Возможно применение по показаниям и в дозах, учитывающих возраст пациентов.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

### Срок годности:

2 года.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

## **Фильтрум-СТИ**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Filtrum-STI>