Финалгель



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пироксикам

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения 0.5%*** прозрачный или слегка опалесцирующий, светло-желтого цвета, со слабым запахом изопропилового спирта.

	1 г
пироксикам	5 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, изопропанол, макрогола глицерилкокоат (цетиол HE), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), натрия гидроксид, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), калия дигидрофосфат, вода очищенная.

35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВП. Оказывает местное противовоспалительное и анальгезирующее действие. Механизм действия связан с угнетением синтеза простагландинов вследствие ингибирования активности ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Уменьшает воспаление, отек, мышечную и суставную боль. Не вызывает сухости кожи.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Финалгель не предоставлены.

Показания к применению:

Болевой синдром при:

— спортивных травмах (ушибы, вывихи, растяжения, повреждения связок);

— анкилозирующем спондилоартрите;

— остеоартрозе;

— ревматоидном артрите;

— хроническом ювенильном артрите;

— тендините;

— тендовагините;

— плечелопаточном синдроме.

Относится к болезням:

- Анкилозирующий спондилоартрит
- Артрит
- Артроз
- Вывих
- Вывихи
- Остеоартрит
- Остеоартроз
- Растяжение
- Спондилоартрит
- Тендинит
- Тендовагинит
- Травмы
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— почечная недостаточность;

— детский возраст до 14 лет;

— III триместр беременности;

— повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП;

— повышенная чувствительность к пироксикаму или другим компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат пациентам с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, рецидивирующим полипозом носа и околоносовых пазух, хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими инфекциями дыхательных путей.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 14 лет гель наносят на кожу над пораженной областью в дозе 1 г (примерно соответствует размеру лесного ореха) 3-4 раза/сут.

Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и в среднем составляет 2-3 недели при тендинитах, тендовагинитах, плечелопаточном синдроме, 1-2 недели - при спортивных травмах.

Побочное действие:

Местные реакции: раздражение кожи в месте нанесения препарата (воспаление, покраснение, шелушение).

Аллергические реакции: крапивница, зуд.

Передозировка:

Симптомы: в единичных случаях возможно возникновение системных побочных эффектов (головная боль, тошнота, боли в эпигастрии, одышка; описан один случай развития интерстициального нефрита с функциональной почечной недостаточностью и нефротическим синдромом).

Лечение: препарат следует отменить. Проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в III триместре беременности. В I и II триместрах препарат следует применять с осторожностью.

Пироксикам в незначительных количествах проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять Финалгель в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Финалгель не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата на поврежденные кожные покровы и в глаза.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 14 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. После вскрытия тубы препарат можно использовать в течение 6 мес.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Finalgel