

Финалгель



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пироксикам](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 0.5%** прозрачный или слегка опалесцирующий, светло-желтого цвета, со слабым запахом изопропилового спирта.

| | |
|------------|-------------|
| | 1 г |
| пироксикам | 5 мг |

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, изопропанол, макрогола глицерилкокоат (цетиол HE), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), натрия гидроксид, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), калия дигидрофосфат, вода очищенная.

35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВП. Оказывает местное противовоспалительное и анальгезирующее действие. Механизм действия связан с угнетением синтеза простагландинов вследствие ингибирования активности ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Уменьшает воспаление, отек, мышечную и суставную боль. Не вызывает сухости кожи.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Финалгель не предоставлены.

Показания к применению:

Болевой синдром при:

Финалгель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- спортивных травм (ушибы, вывихи, растяжения, повреждения связок);
- анкилозирующем спондилоартрите;
- остеоартрозе;
- ревматоидном артрите;
- хроническом ювенильном артрите;
- тендините;
- тендовагините;
- плечелопаточном синдроме.

Относится к болезням:

- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Растяжение](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Тендинит](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

- почечная недостаточность;
- детский возраст до 14 лет;
- III триместр беременности;
- повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП;
- повышенная чувствительность к пироксикаму или другим компонентам препарата.

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, рецидивирующим полипозом носа и околоносовых пазух, хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими инфекциями дыхательных путей.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 14 лет гель наносят на кожу над пораженной областью в дозе 1 г (примерно соответствует размеру лесного ореха) 3-4 раза/сут.

Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и в среднем составляет 2-3 недели при тендинитах, тендовагинитах, плечелопаточном синдроме, 1-2 недели - при спортивных травмах.

Побочное действие:

Местные реакции: раздражение кожи в месте нанесения препарата (воспаление, покраснение, шелушение).

Аллергические реакции: крапивница, зуд.

Передозировка:

Финалгель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Симптомы: в единичных случаях возможно возникновение системных побочных эффектов (головная боль, тошнота, боли в эпигастрии, одышка; описан один случай развития интерстициального нефрита с функциональной почечной недостаточностью и нефротическим синдромом).

Лечение: препарат следует отменить. Проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в III триместре беременности. В I и II триместрах препарат следует применять с осторожностью.

Пироксикам в незначительных количествах проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять Финалгель в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Финалгель не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата на поврежденные кожные покровы и в глаза.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 14 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. После вскрытия тубы препарат можно использовать в течение 6 мес.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Finalgel>