

Финалгон



Код АТХ:

- [M02AX10](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Никобоксил](#)
- [Нонивамид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 20 г, 50 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Состав:

1 г мази для наружного применения содержит

Активные вещества: нонивамид 4 мг, никобоксил 25 мг

Вспомогательные вещества: диизопропиладипинат, кремния диоксид коллоидный, вазелин, сорбиновая кислота, масло цитронеллы, вода очищенная.

Описание:

Мазь для наружного применения почти бесцветная или слегка коричневатая, прозрачная или полупрозрачная, однородная, гомогенная.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения с местнораздражающим действием.

Нонивамид является синтетическим аналогом капсаицина и обладает анальгезирующими свойствами, которые проявляются в результате постепенного проникновения активного вещества в периферические ноцицептивные С-волокна и А-дельта-нервные волокна при повторном нанесении препарата на кожу.

Никобоксил оказывает прямое сосудорасширяющее действие.

Нонивамид и никобоксил обладают дополняющими друг друга сосудорасширяющими свойствами, вызывают гиперемиию кожи, увеличивают скорость ферментативных реакций, активизируют обмен веществ.

Появление гиперемии и повышение температуры кожи в течение нескольких минут после нанесения свидетельствуют о быстром проникновении активных веществ в кожу.

Действие Финалгона проявляется локально, развивается через несколько минут и достигает максимума через 20-30 мин.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- артрит;
- артралгия и миалгия ревматического генеза;
- спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного аппарата;
- миалгия, вызванная чрезмерной физической нагрузкой;
- люмбаго;
- неврит;
- ишиалгия;
- бурсит и тендовагинит;
- для предварительного "разогрева" мышц перед физическими упражнениями, спортивными соревнованиями;
- в составе комплексной сосудорасширяющей терапии при нарушениях периферического кровообращения.

Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Бурсит](#)
- [Ишиалгия](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Неврит](#)
- [Растяжение](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Ушибы](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- дерматоз;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к препарату.

Препарат не следует наносить на открытые кожные раны и участки кожи с нарушенной проницаемостью, на шею, низ живота и внутреннюю поверхность бедер.

Способ применения и дозы:

Столбик препарата размером не более 0.5 см мази с помощью прилагаемого аппликатора наносят на соответствующий участок кожи размером с ладонь легкими втирающими движениями. Для усиления лечебного действия участок кожи, на который нанесен препарат, можно накрыть шерстяной тканью.

Для предварительного разогревания мышц перед физическими упражнениями, спортивными соревнованиями рекомендуется втирать мазь примерно за 30 мин до их начала. При многократном применении реакция на мазь может уменьшиться, что требует увеличения дозы, которую подбирают индивидуально.

Мазь применяют 2-3 раза/сут.

Пациента следует предупредить, что в случае отсутствия желаемого эффекта в течение 10 дней, следует обратиться к врачу.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, отек лица.

Легкое кратковременное раздражение кожи и чувство жжения в области нанесения препарата могут усиливаться при применении чрезмерного количества мази.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Финалгон не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Поскольку клинический опыт применения препарата при беременности и в период лактации недостаточен, не рекомендуется назначать Финалгон® этой категории пациентов.

Неизвестно, выделяются ли входящие в состав Финалгона активные вещества с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Финалгон® с другими препаратами, применяемыми местно или системно, не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

После нанесения мази Финалгон® следует тщательно вымыть руки с мылом.

Необходимо соблюдать осторожность и избегать случайного попадания препарата на другие участки кожи, а также в глаза, на слизистые оболочки полости носа или рта, т.к. это вызывает безвредное, но неприятное ощущение жжения.

Пациентам с чувствительной кожей не следует принимать горячую ванну или душ до и после нанесения Финалгона.

В случае применения чрезмерного количества Финалгона эффект может быть уменьшен, если удалить мазь с поверхности кожи при помощи растительного масла или питательного крема, со слизистой оболочки глаза - с помощью медицинского вазелина.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

Финалгон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Finalgon>