Фладекс

Код АТХ:

- D06BB

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает местным противовоспалительным, противозудным, антигистаминным и десенсибилизирующим действиями, а также стимулирует репаративные процессы в коже. Обладает противовирусной активностью в отношении вирусов Herpes simplex 1 и 2 типов и Herpes zoster.

Фармакокинетика

При наружном применении практически не всасывается через поврежденную кожу в системный кровоток.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

— псориаз;

— дерматит (аллергический, атопический, периоральный и себорейный);

— нейродермит;

— фотодерматоз;

— токсикодермия;

— герпес различной локализации;

— опоясывающий лишай.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Герпес
- Дерматит
- Лишай
- Нейродермит
- Псориаз
- Себорея
- Токсикоз
- Фотодерматоз

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С осторожностью: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

При *герпетической инфекции кожи* мазь наносят на пораженные участки 4-6 раз/сут (в т.ч. с помощью чистого тампона). Курс лечения составляет не менее 5 дней (максимум - 10 дней). Терапию следует продолжать до появления корки на пузырьках, либо до полного их заживления.

При *псориазе* и *дерматитах* мазь наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 1-2 раза/сут; возможно использование окклюзионной повязки. Курс лечения - 10-30 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, гиперемия, сухость, шелушение кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации препарат применять с осторожностью.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fladeks