# Флагил (таблетки)



## Код АТХ:

- J01XD01

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метронидазол

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** от белого до светло-желтого цвета, круглые, с гравировкой "F250" на одной стороне; на поперечном разрезе - от белого до светло-желтого цвета.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| метронидазол | 250 мг |

*Вспомогательные вещества:* крахмал пшеничный - 82.15 мг, повидон - 17.5 мг, магния стеарат - 0.35 мг.

*Состав оболочки:* гипромеллоза - 2.1 мг, макрогол 20000 - 0.7 мг.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное, противопротозойное.

## Показания к применению:

— протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая амебный абсцесс печени, кишечный амебиаз (амебная дизентерия), трихомониаз, балантидиаз, лямблиоз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, трихомонадный уретрит;

— инфекции, вызываемые Bacteroides spp. (в т.ч. Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus): инфекции костей и суставов, инфекции ЦНС, в т.ч. менингит,

абсцесс мозга, бактериальный эндокардит, пневмония, эмпиема и абсцесс легких, сепсис;

— инфекции, вызываемые видами Clostridium spp., Peptococcus и Peptostreptococcus: инфекции брюшной полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции органов таза (эндометрит, абсцесс фаллопиевых труб и яичников, инфекции свода влагалища);

— псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков);

— гастрит или язва двенадцатиперстной кишки, связанные с Helicobacter pylori (комплексная терапия);

— профилактика послеоперационных осложнений (особенно вмешательства на ободочной кишке, параректальной области, аппендэктомия, гинекологические операции).

## Относится к болезням:

- Абсцесс
- Абсцесс печени
- Амебиаз
- Амебная дизентерия
- Баланит
- Балантидиаз
- Вагинит
- Гастрит
- Дизентерия
- Инфекции
- Колит
- Лейшманиоз
- Менингит
- Перитонит
- Пневмония
- Сепсис
- Трихомониаз
- Уретрит
- Эмпиема
- Эндокардит
- Эндометрит
- Язва
- Язва двенадцатиперстной кишки

## Противопоказания:

— органические поражения ЦНС;

— болезни крови, в т.ч. лейкопения в анамнезе;

— печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз);

— беременность;

— грудное вскармливание;

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к имидазолам.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. При *амебиазе* Флагил применяют внутрь в течение 7 дней по 1.5 г/сут за 3 приема (взрослые).

*Лямблиоз* лечат в течение 5 дней: **взрослым** назначают по 750-1000 мг/сут, **детям 6-10 лет** - по 375 мг/сут (1.5 таб.) и **детям 10-15 лет** - по 500 мг/сут (2 табл.). Для **детей младше 6 лет** предпочтительнее использование метронидазола в форме суспензии.

При *трихомониазе у женщин (уретрит и вагинит)* Флагил назначают однократно в дозе 2 г или в виде курсового лечения в течение 10 дней: по 1 таб. (250 мг) 2 раза/сут.

При *трихомониазе у мужчин (уретрит)* Флагил назначают однократно в дозе 2 г или в виде курсового лечения в течение 10 дней по 1 таб. (250 мг) 2 раза/сут.

При *неспецифических вагинитах* применяют 500 мг Флагила 2 раза/сут в течение 7 дней.

При лечении *анаэробных инфекций* **взрослым** назначают Флагил по 1-1.5 г/сут.

При **выраженных нарушениях функции почек (КК менее 10 мл/мин)** рекомендовано уменьшить суточную дозу препарата в 2 раза.

## Побочное действие:

*Со стороны ЖКТ:* тошнота, металлический привкус во рту, сухость во рту, снижение аппетита, глоссит, стоматит, панкреатит, анорексия, боли в эпигастрии, рвота, диарея, запор.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, нарушение координации движений, атаксия, спутанность сознания, раздражительность, депрессии, повышенная возбудимость, слабость, бессонница, судороги, спутанность сознания, галлюцинации, периферическая невропатия (особенно при длительном применении).

*Аллергические реакции:* крапивница, кожная сыпь, гиперемия кожи, заложенность носа, лихорадка, артралгии.

*Со стороны мочевыделительной системы:* дизурия, полиурия, цистит, недержание мочи, кандидоз, возможно окрашивание мочи в коричнево-красноватый цвет.

*Прочие:* нейтропения, лейкопения, уплощение зубца Т на ЭКГ.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание: беременность и грудное вскармливание.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Аналогично дисульфираму вызывает непереносимость этанола.

Одновременное применение с дисульфирамом может привести к развитию различных неврологических симптомов (интервал между назначением - не менее 2 недель).

Усиливает действие непрямых антикоагулянтов, что ведет к увеличению времени образования протромбина.

Циметидин подавляет метаболизм метронидазола, что может привести к повышению его концентрации в сыворотке крови и увеличению риска развития побочных явлений.

Одновременное назначение лекарственных средств, стимулирующих ферменты микросомального окисления в печени (фенобарбитал, фенитоин), может ускорять элиминацию метронидазола, в результате чего понижается его концентрация в плазме.

## Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку одновременный прием препарата с алкоголем может оказывать эффект, аналогичный эффекту дисульфирама (чувство жара, рвота, тахикардия), следует предупредить пациентов о том, что во время лечения Флагилом не следует употреблять алкогольные напитки или лекарства, содержащие алкоголь.

Длительное введение препарата желательно проводить под контролем формулы крови. При лейкопении возможность продолжения лечения зависит от риска развития инфекционного процесса.

При лечении трихомонадного вагинита у женщин и трихомонадного уретрита у мужчин необходимо воздерживаться от половой жизни. Обязательно одновременное лечение половых партнеров. Лечение не прекращается во время менструаций. После терапии трихомониаза следует провести контрольные пробы в течение 3 очередных циклов до и после менструации.

После лечения лямблиоза, если симптомы сохраняются, через 3-4 недели провести 3 анализа кала с интервалами в несколько дней (у некоторых успешно лечившихся больных непереносимость лактозы, вызванная инвазией, может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев, напоминая симптомы лямблиоза).

Следует прекратить лечение при появлении атаксии, головокружения, развитии галлюцинаций, при ухудшении неврологического статуса больных.

Необходимо принимать во внимание, что метронидазол может иммобилизовать трепонемы, что приводит к

ложноположительному тесту Нельсона.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В связи с возможностью появления головокружения и других побочных эффектов, связанных с приемом препарата, рекомендуется воздерживаться от управления автомобилем и другими механизмами.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Flagil_tabletki