Фламин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения; оказывает желчегонное, холекинетическое, холеретическое, противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое и ранозаживляющее действие. Усиливает секрецию желчи и увеличивает содержание в ней билирубина, повышает тонус желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного пузыря и желчевыводящих путей, изменяет вязкость и химический состав желчи.

Стимулируя выделение желудочного сока и замедляя эвакуаторную функцию желудка и кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Активирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы; расширяет кровеносные сосуды кишечника.

Способствуя выделению холестерина с желчью, оказывает гипохолестеринемическое действие; обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных бактерий.

Показания к применению:

— гепатохолецистит;

— холецистит;

— дискинезия желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Дискинезия желчевыводящих путей
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— холелитиаз;

— обтурационная желтуха.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30 мин до еды (с небольшим количеством теплой воды), по 1 таб. 3 раза/сут, при необходимости - по 2 таб. 2-3 раза/сут. Курс лечения - 10-40 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, повышение АД у пациентов с артериальной гипертензией.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Повышают активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза.

Источник: http://drugs.thead.ru/Flamin