

Фламин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения; оказывает желчегонное, холекинетическое, холеретическое, противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое и ранозаживляющее действие. Усиливает секрецию желчи и увеличивает содержание в ней билирубина, повышает тонус желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного пузыря и желчевыводящих путей, изменяет вязкость и химический состав желчи.

Стимулируя выделение желудочного сока и замедляя эвакуаторную функцию желудка и кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Активирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы; расширяет кровеносные сосуды кишечника.

Способствуя выделению холестерина с желчью, оказывает гипохолестеринемическое действие; обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных бактерий.

Показания к применению:

- гепатохолецистит;
- холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- холелитиаз;
- обтурационная желтуха.

Способ применения и дозы:

Внутрь, за 30 мин до еды (с небольшим количеством теплой воды), по 1 таб. 3 раза/сут, при необходимости - по 2 таб. 2-3 раза/сут. Курс лечения - 10-40 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, повышение АД у пациентов с артериальной гипертензией.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Повышают активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Flamin>