

Фларекс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

ГКС для местного применения. Терапевтическая эффективность обусловлена противовоспалительным, противоаллергическим и антиэкссудативным (благодаря вазоконстрикторному эффекту) действием.

Показания к применению:

Лечение воспалительных заболеваний конъюнктивы, роговицы, переднего отдела глаза.

Относится к болезням:

- [Конъюнктивит](#)

Противопоказания:

Вирусные заболевания, туберкулез, грибковые инфекции, нелеченные бактериальные инфекции, повышенная чувствительность к флуорометолону.

Способ применения и дозы:

Применяют путем инстилляций в конъюнктивальный мешок 2-4 раза/сут. Длительность лечения устанавливают индивидуально.

Побочное действие:

Возможны глаукома, повреждение глазного нерва, снижение остроты зрения, нарушения поля зрения, формирование катаракты, развитие вторичной инфекции, перфорация тканей глаза.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения флуорометолонa при беременности не изучена. Неизвестно, выделяется ли флуорометолон с грудным молоком у человека. При необходимости применения при беременности и в период лактации следует тщательно взвесить предполагаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для плода или ребенка.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении повышается риск развития глаукомы, повреждения глазного нерва, нарушения остроты зрения, вторичной инфекции глаз.

При появлении язвенных поражений роговицы на фоне применения кортикостероидов следует иметь в виду возможность грибковой инвазии.

При заболеваниях, вызывающих истончение роговицы или склеры, в случае длительного применения кортикостероидов возможна перфорация этих структур.

Безопасность применения флуорометолонa при беременности не изучена. Неизвестно, выделяется ли флуорометолон с грудным молоком у человека. При необходимости применения при беременности и в период лактации следует тщательно взвесить предполагаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для плода или ребенка.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Flareks>